



การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

นุรินยา แหลมมัด
อ้อมเดือน บุญญาณณี
ดารารัตน์ สารพันธ์
สยาม นุสิกะไชย
วราลักษณ์ วงศรวิทย์

กลุ่มการกิจกรรมวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2555

ชื่องานวิจัย : การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
บ้าสเปดิติค

ผู้วิจัย : นางนรินยา แหลมมัค, นางดารารัตน์ สารพันธ์, น.ส.อ้อมเดือน
นุญญาณณี, นางวรลักษณ์ วงศ์ราษฎร์, นายสยาม มุติกะไชย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สังขละ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ : 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนของพยาบาล และระดับการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยบ้าสเปดิติค และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของพยาบาล และการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยบ้าสเปดิติค กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนของครอบครัวผู้ป่วยบ้าสเปดิติคที่มารับบริการในสถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดรักษาบ้าสเปดิติกุมภาพันธ์ 6 แห่ง (สังขละ, ปีตคานี, เชียงใหม่, แม่อ่องสอน, ขอนแก่นและอุตรธานี) จำนวน 208 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์效 reliability ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ 0.93 โดยแบบสอบถามการสนับสนุนของพยาบาลเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามการปฏิบัติของครอบครัวเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของพยาบาล และการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยบ้าสเปดิติคโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบ้าสเปดิติค โดยรวม และรายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ โดยรวม ($M = 4.04$, $S.D. = 0.59$) และรายด้าน ด้านการรับรู้ความต้องการของครอบครัว ($M = 4.09$, $S.D. = 0.58$) ด้านการประคับประคองอารมณ์ ($M = 4.07$, $S.D. = 0.68$) และด้านการให้ข้อมูล ($M = 3.95$, $S.D. = 0.70$) ส่วนการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยบ้าสเปดิติค โดยรวม และรายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ โดยรวม ($M = 4.24$, $S.D. = 0.53$) และรายด้าน ด้านความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ($M = 4.34$, $S.D. = 0.58$) ด้านความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและการยอมรับ ($M = 4.26$, $S.D. = 0.54$) ด้านความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ ($M = 4.21$, $S.D. = 0.64$) และด้านความต้องการความปลดปล่อย ($M = 4.12$, $S.D. = 0.66$) ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของพยาบาล

และการปฏิบัติของครอบครัวในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติด พนบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยครั้งนี้ช่วยให้พยาบาลนำมาราใช้ในการวางแผนส่งเสริมการสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งจะสามารถพัฒนาการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกันระหว่างพยาบาลและครอบครัวอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติดต่อไป

Nurse's Support and Family's Practices in Caring for Drug Addicted Patients

ABSTRACT

This purpose of this descriptive research was to describe The relationship between nurse's supple and family's practices in caring for drug addicted patients. The sample comprised 208 representatives of drug addicted families who cared for patients. The instrument was a questionnaire developed by the researcher based on literature review. The content validity of the questionnaire was assessed by 3 experts. Reliability was verified for internal consistency using Cranach's alpha coefficient with the overall value of 0.93 and value for each aspect 0.94 and 0.91, respectively. Data analyzed using frequency, mean, standard deviation and Pearson's product-moment correlation coefficient.

The results revealed that overall nurse's support in caring for drug addicted patients at a high level ($M = 4.04$, $S.D. = 0.59$) Each component was also a high level, as follows : recognizing needs of families ($M = 4.09$, $S.D. = 0.58$), providing emotional support ($M = 4.07$, $S.D.=0.68$) and providing information support ($M = 3.95$, $S.D. = 0.70$). Overall family's practices in caring for drug addicted patients was at a high level ($M = 4.24$, $S.D. = 0.53$) Each component was also a high level, as follows : self – actualization need ($M = 4.43$, $S.D. = 0.58$), esteem need ($M = 4.26$, $S.D. = 0.54$), belongingness and love needs ($M = 4.21$, $S.D. = 0.64$) and safety of security needs ($M = 4.12$, $S.D. = 0.66$). There was statistically significant relationship between nurse's support and family's practices. The results should be useful for nurse in develop nurse's support guideline and promoting the family role in caring for their patients to improve their quality of life .

กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ปรีชา จันทร์มณี ซึ่งเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องของการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนให้กำลังใจด้วยคิดเสมอมา ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่

ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์ธนรัตน์ พุทธชาติ, คุณบุญราศี ช่างเหล็ก และคุณ ถวดี ทองหนูอุ๊ป ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา ปัจจุบันนี้ เชิญให้มี แม่ของสอน ขอนแก่น อุดรธานี สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ที่ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลและขอบคุณครอบครัวผู้ป่วยที่ ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

ผู้ศึกษาขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่สนับสนุน ช่วยเหลือให้งานวิจัยครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะมีส่วนคือที่ เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อันจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงต่อไปและขออนุโมทนาดี ของการศึกษาครั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบข้างต้นตลอดจนผู้ที่ยังไม่ได้อ่านมาในที่นี้ทุกท่าน

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

หน้า

บททัศน์ย่อ.....	(2)
Abstract.....	(4)
กิตติกรรมประกาศ.....	(5)
สารบัญ.....	(6)
รายการตาราง.....	(8)
บทที่	
1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย.....	3
คำนำการวิจัย.....	3
กรอบแนวคิดการวิจัย.....	4
นิยามศัพท์.....	5
ขอบเขตการวิจัย.....	6
ความสำคัญของการวิจัย.....	6
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
การสนับสนุนของพยาบาลในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติดของครอบครัว.....	7
การปฏิบัติของครอบครัวในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติด.....	15
การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการคุ้มครองผู้ป่วยยาเสพติด....	18
แนวคิดการนำรักษาผู้ติดยาเสพติด.....	21
3. วิธีดำเนินการวิจัย.....	29
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	29
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	30
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....	31
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	31
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	32
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	32

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล.....	33
ผลการวิจัย.....	33
อภิปรายผล.....	48
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	55
สรุปผลการวิจัย.....	55
ข้อเสนอแนะ.....	58
บรรณานุกรม.....	60
ภาคผนวก.....	65
ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	66
ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ.....	76
ก เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร.....	77
ประวัติผู้วิจัย.....	80

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1. จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล(ครอบครัว).	33
2. จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล(ผู้ป่วย)....	36
3. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนของพยาบาล รวมทุกค้าน.....	38
4. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนของพยาบาล ด้านการรับรู้ความต้องการของครอบครัว.....	39
5. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสนับสนุนของพยาบาล ด้านการประคับประคองอารมณ์.....	40
6. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนของพยาบาล ด้านการให้ข้อมูล.....	41
7. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัว รวมทุกค้าน.....	42
8. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัว ด้านความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้.....	43
9. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการปฏิบัติของครอบครัว ด้านความต้องการได้รับการยกย่องยอมรับ.....	44
10. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติของครอบครัว ด้านความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ.....	45
11. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการปฏิบัติของครอบครัว ด้านความต้องการความปลดภัย.....	46
12. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการสนับสนุนของพยาบาล กับการปฏิบัติของครอบครัว	47