

## บทที่ 4

### ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Description research) เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พ.ศ. 2545 ในสถานบำบัดรักษาสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแบบไม่เข้มงวดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พ.ศ. 2545 ในสถาบันชันัญญรักษ์ และศูนย์บำบัดรักษาเสพติดในส่วนภูมิภาค 5 ศูนย์ จำนวน 1,000 ราย ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยตารางประกอบคำบรรยายโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ และส่วนที่ 2 ข้อมูลแยกตามสถานบำบัด โดยแต่ละส่วนแสดงข้อมูลแบ่งเป็น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ 2 ประวัติการใช้สารเสพติด

ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว

ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน

ตอนที่ 5 สภาพแวดล้อมด้านชุมชน

ตอนที่ 6 ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ

ตอนที่ 7 ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 1,000)

ข้อมูลส่วนบุคคล		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	732	73.40
	หญิง	265	26.60
อายุ (ปี) ( $\bar{X}$ = 27.46, min = 12, max = 67)			
	12-20	223	22.30
	21-40	684	68.30
	41-60	87	8.70
	61-70	1	0.10

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

	ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
ภูมิลำเนา			
	ภาคเหนือ	263	26.50
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	174	17.60
	ภาคกลาง	357	36.00
	ภาคใต้	197	19.90
ศาสนา			
	พุทธ	858	85.80
	อิสลาม	124	12.40
	คริสต์	18	1.80
สถานภาพ			
	โสด	595	59.70
	สมรส	261	26.20
	หย่าร้าง	52	5.20
	แยกกันอยู่	73	7.30
	หม้าย	16	1.60
ระดับการศึกษา			
	ไม่ได้เรียนหนังสือ	50	5.00
	ประถมศึกษา	433	43.30
	มัธยมศึกษา/ปวช.	477	47.70
	อนุปริญญา/ปวส.	33	3.30
	ปริญญาตรี	6	0.60
อาชีพปัจจุบัน			
	รับจ้างทั่วไป	440	44.00
	ว่างงาน	219	21.90
	ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	124	12.40
	เกษตรกรรม	88	8.80

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
นักเรียน/นักศึกษา	67	6.70
คาราโอเกะ	22	2.20
แม่บ้าน	20	2.00
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	15	1.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	5	0.50
รายได้ต่อเดือน (บาท)		
ไม่มีรายได้	248	24.90
1-3,000	160	16.10
3,001-6,000	305	30.60
6,001-10,000	203	20.40
10,001-15,000	50	5.00
มากกว่า 15,000	30	3.00
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด		
ฟันผุ	200	20.00
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	126	12.60
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เช่น หอบหืด, ไซนัส)	107	10.70
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	61	6.10
โรคผิวหนัง เช่น กลาก เกาฬ	56	5.60
ไมเกรน	46	4.60
โรคหัวใจ ความดัน	26	2.60
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	61	6.10
โลหิตจาง	19	1.90
โรคลมชัก	8	0.80
โรคตับ	7	0.70
วัณโรค	6	0.60
เบาหวาน	4	4.00

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัด</b>		
ฟันผุ	197	19.70
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	143	14.30
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เช่น หอบหืด, ไซนัส)	76	7.60
โรคผิวหนัง เช่น กลาก เกาต์	69	6.90
ไมเกรน	40	0.40
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	40	0.40
โรคหัวใจ ความดัน	23	2.30
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	12	1.20
โลหิตจาง	11	1.10
โรคตับ	6	0.60
โรคลมชัก	4	0.40
เบาหวาน	4	0.40
วัณโรค	3	0.30
<b>*อาการทางจิต</b>		
Inorganic insomnia	18	1.80
Adjustment disorder	6	0.60
Anxiety disorder	9	0.90
Depressive disorder	7	0.70
Bipolar disorder	2	0.20
Schizophrenia disorder	8	0.80
Acute psychosis disorder	4	0.40
Substance induced psychosis disorder	4	0.40

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.30 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 27.46 ปี ร้อยละ 73.40 เป็นเพศชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางร้อยละ 36.00 รองลงมาภาคเหนือ ร้อยละ 26.50 ภาคใต้ร้อยละ 19.90 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.60 ตามลำดับ นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 85.80 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 12.40 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.80 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.70 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 26.20 สมรส ร้อยละ 7.30 แยกกันอยู่ การศึกษาสูงสุดในระดับ มัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 44.00 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.30 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 5.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.00 ว่างาน ร้อยละ 21.90 ประกอบธุรกิจส่วนตัวและค้าขายร้อยละ 12.40 มีระดับรายเฉลี่ย 3,001-6,000 บาทต่อเดือน

ปัญหาสุขภาพก่อนและระหว่างการบำบัดรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.50 มี ปัญหาสุขภาพก่อนการเข้าบำบัดรักษา ร้อยละ 44.40 มีปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัดรักษาโดย โรคที่พบ 3 อันดับแรก คือ พันผุ ร้อยละ 20.00, 19.70 รองลงมา คือ ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก ร้อยละ 12.60, 14.30 และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ไชน์ส ภูมิแพ้ ร้อยละ 10.70, 7.60 มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ร้อยละ 4.70 อันดับแรก คือ Inorganic insomnia ร้อยละ 0.90 รองลงมา Anxiety disorder ร้อยละ 0.80 และ Schizophrenia disorder ร้อยละ 0.80

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มตัวอย่าง (N = 1,000)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
บุหรี	355	35.50
สุรา	310	31.00
ยาบ้า	92	9.20
ยาแก้ไอ	50	5.00
กัญชา	32	3.20
ขาดความอ้วน	29	2.90
กระท่อมหรือสีสุณร้อย	27	2.70
ยานอนหลับ	27	2.70

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
สารระเหย	11	1.10
เฮโรอีน	10	1.00
ยาไอซ์	7	0.70
ยาอี	11	1.10
ยาเค	3	0.30
โคเคน	1	0.10
ฝิ่น	1	0.10
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
ยาบ้า	579	57.90
บุหรี	575	57.50
สุรา	541	54.10
กัญชา	326	32.60
ยาไอซ์	147	14.70
สารระเหย	111	11.10
กระท่อมหรือสีสุ่มร้อย	104	10.40
ยาแก้ไอ	103	10.30
ยาอี	80	8.00
เฮโรอีน	66	6.60
ยานอนหลับ	53	5.30
ขาดความอ้วน	43	4.30
ยาเค	42	4.20
โคเคน	24	2.40
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	877	87.70
บุหรี	770	77.00
สุรา	600	60.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
กัญชา	380	38.00
ยาแก้ไอ	162	16.20
ยาไอซ์	159	15.90
สารระเหย	110	11.00
กระท่อมหรือสีคุณร้อย	106	10.60
ยานอนหลับ	97	9.70
เฮโรอีน	72	7.20
ยาอี	65	6.50
ขาดความอ้วน	46	4.60
ยาเค	21	2.10
ฝิ่น	18	1.80
โคเคน	14	1.40

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 35.50 (เฉลี่ย 355 คน) ต้มสุรา ร้อยละ 31.00 (เฉลี่ย 310 คน) ยาบ้า ร้อยละ 9.20 (เฉลี่ย 92 คน) จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า เพื่อนสนิทของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.90 ใช้ยาบ้า (เฉลี่ย 579 คน) ร้อยละ 57.50 สูบบุหรี่ (เฉลี่ย 575 คน) ร้อยละ 54.10 ต้มสุรา (เฉลี่ย 541 คน) จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.70 ใช้ยาบ้า (เฉลี่ย 877 คน) ร้อยละ 77.00 สูบบุหรี่ (เฉลี่ย 770 คน) ร้อยละ 60.00 ต้มสุรา (เฉลี่ย 600 คน)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด (N = 1,000)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X}$ = 18.86, SD = 5.80, min = 7, max = 46)		
7-20	742	75.80
21-40	227	23.10
41-60	9	0.90
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	618	62.00
เพื่อนชวน	207	20.80
เครียด/ไม่สบายใจ	57	5.70
เพื่อความสนุกสนาน	51	5.10
ช่วยอาชีพ	48	4.80
ลดน้ำหนัก	12	1.20
เพิ่มความมั่นใจ	4	0.40
สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	653	67.30
กัญชา	214	22.00
สารระเหย	50	5.10
ฝิ่น	16	1.60
ยาไอซ์	11	1.10
ยาอี	5	0.50
กระท่อมหรือสีสุคนธ์ร้อย	3	0.30
ยาแก้ไอ	3	0.30
โคเคน	2	0.20



## ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้เสพ	587	58.80
ผู้ติด	381	38.10
เสพยาชนิดรุนแรง		
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	549	55.20
ใช้เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน	243	24.40
ใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือเกือบทุกสัปดาห์	169	17.00
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	34	3.40
วิธีการเสพ		
สูบ	919	92.10
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	38	3.80
กิน	33	3.30
ฉีด	8	0.80
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติด		
เพื่อความสนุกสนาน	338	34.00
เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ	209	21.00
เพื่องานอาชีพ	192	19.20
ติดใจในรสชาติ/ฤทธิ์ยา	141	14.20
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	42	4.20
ไม่เคยคิดจะเลิก	32	3.20
เพื่อการเข้าสังคม	29	2.90
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	10	1.00

## ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*แหล่งซื้อสารเสพติด</b>		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	805	80.70
มีผู้มาจำหน่ายถึงที่	350	35.10
จากสถานบันเทิง	73	7.30
แฟน/สามี/ภรรยา	59	5.90
ร้านค้า	21	2.10
<b>ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท/วัน)</b>		
200-300	292	29.40
> 500	228	23.00
300-500	194	19.60
101-200	119	12.00
51-100	81	8.20
1-50	78	7.90
<b>บุคคลใกล้ชิด</b>		
ทราบ	538	54.10
ไม่ทราบ	445	44.80
ไม่แน่ใจ	11	1.10
<b>การบำบัดรักษา</b>		
ไม่เคย	765	76.50
เคย	235	23.50
<b>จำนวนครั้งในการบำบัด</b>		
1-2 ครั้ง	200	85.10
3-4 ครั้ง	29	12.34
> 5 ครั้ง	6	2.55

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ระยะเวลา	ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
	1 เดือน	407	41.70
	4 เดือน	284	29.10
	2 เดือน	150	15.40
	3 เดือน	135	13.80
	*คดีที่ถูกจับกุม		
	ยาบ้า	859	85.90
	กัญชา	135	13.50
	เฮโรอีน	31	3.10
	ยาไอซ์	15	1.50
	ฝิ่น	13	1.30
	กระท่อม	9	0.90
	สารระเหย	5	0.50
	ยาอี	2	0.20
	ยาแก้ไอ	1	0.10

\* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 18.86 ปี (SD = 5.80) อายุต่ำสุด 7 ปี สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรกคือ อยากรลอง ร้อยละ 62.00 เพื่อนชวน ร้อยละ 20.80 เครียดหรือไม่สบายใจ ร้อยละ 5.70 ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก ยาบ้า ร้อยละ 67.30 กัญชา ร้อยละ 22.00 สารระเหย ร้อยละ 5.10 ประเภทผู้ป่วย ผู้เสพ ร้อยละ 58.80 ผู้ติด ร้อยละ 38.10 และเสพติดรุนแรง ร้อยละ 3.10 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน ใช้เป็นบางครั้ง เมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 55.20 ใช้เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 24.40 ใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือเกือบทุกสัปดาห์ ร้อยละ 17.00 วิธีการเสพโดยการสูบ ร้อยละ 92.10 กิน ร้อยละ 3.30 และใช้ร่วมกับเครื่องดื่ม ร้อยละ 3.80 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 34.00 เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ ร้อยละ 21.00

เพื่อนหรืออาชีพ ร้อยละ 19.20 แหล่งซื้อขายเสพติดจากเพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน ร้อยละ 80.70 มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่ ร้อยละ 35.10 จากสถานบันเทิง ร้อยละ 7.30 ค่าใช้จ่ายในการเสพยา 200-300 บาท/วัน บุคคลใกล้ชิดคิดว่ากลุ่มตัวอย่างใช้สารเสพติด ร้อยละ 54.10 ไม่ทราบ ร้อยละ 44.80 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 76.70 เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 23.50 จำนวนครั้งในการบำบัดรักษา 1-2 ครั้ง ร้อยละ 85.10 3-4 ครั้ง ร้อยละ 12.34 และมากกว่า 5 ครั้ง ร้อยละ 2.55 ระยะเวลาบำบัดขณะที่ตอบแบบสอบถาม บำบัดนาน 1 เดือน ร้อยละ 41.70 รองลงมา 4 เดือน ร้อยละ 29.10 และ 2 เดือน ร้อยละ 15.40 คดีที่ถูกจับกุม คือ ยาบ้า ร้อยละ 89.50 กัญชา ร้อยละ 13.50 เฮโรอีน ร้อยละ 3.10 อื่นๆ เช่น ไอซ์ ฟีน กระท่อม สารระเหย ยาอี และ ยาแก้ไอ ตามลำดับ

**ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว (N = 1,000)**

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพการครองเรือน บิดา-มารดา		
อยู่ด้วยกัน	428	43.00
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	251	25.20
บิดาถึงแก่กรรม	179	18.00
บิดามารดาถึงแก่กรรม	77	7.70
มารดาถึงแก่กรรม	61	6.10
กรณีที่เป็นบิดา-มารดาแยกกันอยู่		
บิดาและมารดามีครอบครัวใหม่	95	37.90
บิดามีภรรยาใหม่	70	27.90
มารดามีสามีใหม่	69	27.30
บิดาและมารดาแยกกัน โดยไม่ได้มีครอบครัวใหม่	17	6.90

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ที่พักอาศัยในปัจจุบัน</b>		
บิดามารดา	317	31.80
สามี/ภรรยา	231	23.20
มารดา	200	20.10
ญาติ	141	14.20
คนเดียว	64	6.40
บิดา	52	5.20
เพื่อนสนิท/แฟน	52	5.20
<b>อาชีพหลักบิดา</b>		
รับจ้างทั่วไป	344	39.90
เกษตรกรรม	187	21.70
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	149	14.20
ว่างงาน	100	10.00
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	83	9.60
<b>อาชีพหลักของมารดา</b>		
รับจ้างทั่วไป	285	31.00
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	259	31.00
เกษตรกรรม	181	19.70
ว่างงาน	116	12.60
แม่บ้าน	46	5.00
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	33	3.60
<b>รายได้ของบิดามารดา</b>		
< 5,000	331	36.20
5,001-10,000	310	33.90
10,001-15,000	114	12.50
15,001-20,000	69	7.50
>20,000	91	9.90

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{X} = 2.22$ , $SD = 2.08$ , $\min = 1$ , $\max = 13$ )		
คนเดียว	155	15.90
2 คน	298	30.50
3 คน	210	21.50
4 คน	119	12.20
5 คนขึ้นไป	195	19.90
ลำดับพี่น้อง ( $\bar{X} = 2.22$ , $SD = 1.64$ , $\min = 1$ , $\max = 14$ )		
1	437	44.50
2	253	25.80
3	135	13.70
4	70	7.10
5 ขึ้นไป	87	8.80
จำนวนสมาชิกในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.63$ , $SD = 2.35$ , $\min = 1$ , $\max = 18$ )		
1-5 คน	703	72.60
6-10 คน	246	25.40
11 คนขึ้นไป	20	2.00
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	576	57.90
ผู้อาศัย	250	25.20
หัวหน้าครอบครัว	159	16.00
หาเลี้ยงครอบครัว	9	0.90
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	395	39.90
บิดา	153	15.40
สามี/ภรรยา	153	15.40
พี่น้อง	106	10.70
ญาติ	106	10.70

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	602	61.30
ทะเลาะกันบางครั้ง	313	31.90
ไม่ค่อยเจอกัน	43	4.30
ทะเลาะกันเป็นประจำ	24	2.40
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	701	71.10
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	116	11.80
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	95	9.60
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	74	7.50
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
มารดา	255	25.80
บิดามารดา	240	24.30
พี่น้อง	162	16.40
เพื่อนสนิท	154	15.60
สามี/ภรรยา	122	12.30
บิดา	56	5.70

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาด้านสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนบิดา มารดากลุ่มตัวอย่างอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 43.00 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 25.20 บิดาถึงแก่กรรม ร้อยละ 18.00 กรณีที่บิดา มารดาแยกกันอยู่ บิดาและมารดามีครอบครัวใหม่ ร้อยละ 37.90 บิดามีภรรยาใหม่ ร้อยละ 27.90 และมารดามีสามีใหม่ ร้อยละ 27.30 ที่พักอาศัยในปัจจุบัน พักอาศัยกับบิดามารดา ร้อยละ 31.80 อยู่กับสามีหรือภรรยา ร้อยละ 23.20 และมารดา ร้อยละ 20.10 อาชีพหลักของบิดา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 39.90 เกษตรกรรม ร้อยละ 21.70 ค้าขายหรือธุรกิจ ร้อยละ 14.20 อาชีพหลักของมารดา รับจ้างทั่วไปและค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 31.00 เกษตรกรรม ร้อยละ 19.70 และแม่บ้าน ร้อยละ 5.00 รายได้ของบิดามารดา ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน 2 คน ร้อยละ 30.50 รองลงมา คือ 3 คน ร้อยละ 21.50

และ 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 19.90 ลำดับพี่น้องในครอบครัวลำดับแรก ร้อยละ 44.50 ลำดับที่ 2 ร้อยละ 25.80 และลำดับที่ 3 ร้อยละ 13.70 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 5 คน ร้อยละ 72.6 เฉลี่ย 4.63 คน (SD = 2.35) รองลงมา 6-10 ร้อยละ 25.40 และ 11 คนขึ้นไป ร้อยละ 2.00 มีสถานภาพเป็นสมาชิก ร้อยละ 57.90 เป็นผู้อาศัย ร้อยละ 25.20 และหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 16.00 บุคคลที่ไว้วางใจลำดับแรก มารดา ร้อยละ 39.90 รองลงมา บิดา สามีมหรือภรรยา ร้อยละ 15.40 และพี่น้อง ร้อยละ 10.70 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 61.30 ทะเลาะกันบางครั้ง ร้อยละ 31.90 และไม่ได้อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 4.30 ลักษณะการเลี้ยงดูจากครอบครัว เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล ร้อยละ 71.10 เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง ร้อยละ 11.80 และเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด ร้อยละ 9.60 การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ลำดับแรก มารดา ร้อยละ 25.80 รองลงมา บิดามารดา ร้อยละ 24.30 และพี่น้อง ร้อยละ 16.40

**ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวม ในแต่ละด้าน**

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.63	0.54	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.41	0.78	มาก
ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชน	3.36	0.60	มาก
ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ	2.49	0.42	มาก
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.72	0.53	มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.72$ , SD = 0.53) ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ( $\bar{X} = 3.63$ , SD = 0.53) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.41$ , SD = 0.78) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.41$ , SD = 0.78) ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.49$ , SD = 0.42)



ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของ  
ครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ (N = 1,000)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ การปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคล ในครอบครัว	4.67	0.76	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	4.56	0.89	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	4.00	0.94	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	3.99	1.11	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจท่าน	3.54	1.05	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.54	0.98	มาก
ครอบครัวรู้สึกเป็นกังวลหรือกลัวกับปัญหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	3.51	1.06	มาก
เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคคนในครอบครัว	3.78	1.12	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ภายในครอบครัว	3.49	1.22	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวเรื่องสุขภาพของท่าน	3.07	1.01	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.00	1.28	มาก
	3.51	1.06	มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัว  
ของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.67$ ,  $SD = 0.76$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือ  
ทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.56$ ,  $SD = 0.89$ ) และทุกคนในครอบครัว  
รักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี ( $\bar{X} = 4.00$ ,  $SD = 0.94$ )

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน จำแนกเป็นรายชื่อ (N = 1,000)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	3.97	1.05	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด	3.85	1.15	มาก
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาอีก	3.84	1.07	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.77	1.08	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.69	1.22	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เมื่อถูกชวนให้เสพยาเสพติดอีก	3.67	1.12	มาก
ท่านเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.60	1.24	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.33	1.23	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	3.18	1.22	มาก
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเสพยาเสพติด	2.89	1.23	มาก
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	2.80	1.13	มาก
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.66	1.15	ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่อยู่ในระดับปานกลางข้อเดียว คือ กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 2.66$ ,  $SD = 1.15$ ) ส่วนข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 3.97$ ,  $SD = 1.05$ ) รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 3.85$ ,  $SD = 1.15$ ) และเพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X} = 3.84$ ,  $SD = 1.07$ )

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N = 1,000)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
<b>* สภาพแวดล้อมด้านชุมชน</b>		
ในชุมชนมีโครงการณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	586	59.4
ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด	508	51.2
เคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกำหนายาเสพติด	474	47.8
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่าย/ใช้ยาเสพติด	403	40.6

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพแวดล้อมด้านชุมชน ร้อยละ 59.4 ในชุมชนมีโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 51.2 ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด และร้อยละ 47.8 กลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N = 1,000)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนละแวกบ้านหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปราม ยาเสพติดอย่างจริงจัง	3.94	1.17	มาก
ท่านมักไปในสถานที่ที่มั่วสุ่มยาเสพติด	3.77	1.11	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียน บ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติด ที่หาซื้อได้ง่าย	3.62	1.19	มาก
คนในละแวกบ้าน เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับเพราะคิดว่า ท่านติดยาเสพติด	3.52	1.24	มาก
ท่านติดยาเสพติด	3.48	1.13	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียน บ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	3.29	1.13	มาก
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	3.28	1.29	มาก
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	3.10	1.18	มาก

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	3.09	1.30	มาก
ตั้งแต่ท่านใช้ยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	2.63	1.54	ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” ในด้านสิ่งแวดล้อมด้านชุมชน จำนวน 9 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยอันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้านหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X} = 3.94$ ,  $SD = 1.17$ ), รองลงมาที่ท่านทำงาน หรือ โรงเรียน หรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X} = 3.77$ ,  $SD = 1.11$ ), และท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด ( $\bar{X} = 3.62$ ,  $SD = 1.19$ ) ระดับปานกลาง คือ ตั้งแต่ท่านใช้ยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน ( $\bar{X} = 2.63$ ,  $SD = 1.54$ )

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายข้อ (N = 1,000)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	3.21	1.12	มาก
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่า ที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.17	1.15	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	3.07	1.10	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	2.73	1.01	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.72	1.35	มาก
เมื่อเจอปัญหาหรือสิ่งเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ ทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.45	1.05	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.20	1.17	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน	2.19	1.02	ปานกลาง

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.10	1.04	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้อง เข้าสถานบำบัด	1.18	1.19	น้อย

จากตารางที่ 10 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติด เราไม่สามารถควบคุมมันได้ ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 3.21$ ,  $SD = 1.12$ ), ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.17$ ,  $SD = 1.15$ ), ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 3.07$ ,  $SD = 1.10$ ), ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ( $\bar{X} = 2.73$ ,  $SD = 1.013$ ), ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้ ( $\bar{X} = 2.72$ ,  $SD = 1.355$ )

กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” ในหัวข้อ เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้าย ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น ( $\bar{X} = 2.45$ ,  $SD = 1.051$ ), การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าจะไม่ได้เป็นการทำผิดหลักศาสนา ( $\bar{X} = 2.20$ ,  $SD = 1.171$ ), สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน ( $\bar{X} = 2.19$ ,  $SD = 1.026$ ), ท่านยึดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าบุคคลรอบข้าง และเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงน้อย” ในหัวข้อ การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสถานบำบัด ( $\bar{X} = 1.18$ ,  $SD = 1.191$ )

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด  
จำแนกเป็นรายข้อ (N = 1,000)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.45	0.72	มาก
การเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.24	0.88	มาก
การเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม	4.09	0.97	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพติด	4.08	1.09	มาก
สังคมไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	3.98	0.98	มาก
การเสพติดเป็นสิ่งโก้ เก๋ ทันสมัย	3.95	1.01	มาก
การเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.88	1.05	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพติด	3.68	0.95	มาก
การเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.67	1.13	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียาพิษต่อข้าพเจ้า	3.65	1.09	มาก
การเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.49	1.04	มาก
การเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.44	1.24	มาก
การเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.41	1.06	มาก
การเสพติดช่วยแก้แอมการเงินอายุได้	3.29	1.13	มาก
การเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.81	1.11	มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ด้านทัศนคติต่อสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก คือ การเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X}= 4.45$ , SD = 0.72) รองลงมา คือ การเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X}= 4.24$ , SD = 0.88) และการเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ( $\bar{X}= 4.09$ , SD = 0.97)

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลแยกตามสถานบำบัดรักษา (หน่วยเก็บข้อมูล)

### 2.1 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 189)

ข้อมูลส่วนบุคคล		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	140	74.90
	หญิง	47	25.10
อายุ ( $\bar{X}$ = 26.99, min = 13, max = 54)			
	12 – 20	47	24.90
	21 – 40	125	66.10
	41 – 60	17	8.90
ศาสนา			
	พุทธ	176	93.10
	อิสลาม	4	2.10
	คริสต์	9	4.80
สถานภาพ			
	โสด	128	68.10
	สมรส	39	20.70
	อยู่ร้ง	12	6.40
	แยกกันอยู่	8	4.30
	หม้าย	1	0.50
การศึกษาสูงสุด			
	ไม่ได้เรียนหนังสือ	6	3.20
	ประถมศึกษา	57	30.30
	มัธยมศึกษา/ปวช.	115	61.20
	อนุปริญญา/ปวส.	9	4.80
	ปริญญาตรี	1	0.50

## ตารางที่ 12 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพปัจจุบัน		
ว่างงาน	38	20.10
นักเรียน/นักศึกษา	23	12.20
เกษตรกร	17	9.00
รับจ้างทั่วไป	80	42.30
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	21	11.10
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	1.10
คาราโอเกะ	5	2.60
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง	1	0.50
แม่บ้าน	2	1.10
รายได้ต่อเดือน (บาท)		
ไม่มีรายได้	52	27.70
1 – 3,000	29	15.40
3,001 – 6,000	66	35.10
6,001 – 10,000	27	14.40
10,001 – 15,000	10	5.30
> 15,000	4	2.10
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด		
ฟันผุ	26	13.80
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	23	12.20
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	20	10.60
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	19	10.10
ไมเกรน	10	5.30
โรคผิวหนัง	5	2.60
โรคหัวใจ ความดัน	5	2.60
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	4	2.10

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



## ตารางที่ 12 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ปัญหาสุขภาพระหว่างการบำบัด</b>		
ฟันผุ	26	13.80
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	22	11.60
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	13	6.90
กระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ	13	6.90
ไมเกรน	9	4.80
โรคผิวหนัง	8	4.20
โรคหัวใจ	6	3.20
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	4	2.10
โรคตับอักเสบ	4	2.10
โลหิตจาง	3	1.60
เบาหวาน	1	0.50
<b>อาการทางจิต</b>		
Inorganic insomnia	1	0.50
adjustment disorder	1	0.50
anxiety disorder	1	0.50
depressive disorder	1	0.50
Bipolar disorder	1	0.50
Schizophrenia disorder	1	0.50
Acute psychosis	1	0.50
Substance induced psychosis disorder	1	0.50

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.10 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 26.99 ปี เพศชาย ร้อยละ 74.90 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.10 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 68.10 สมรส ร้อยละ 20.70 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 61.20 ประถมศึกษา ร้อยละ 30.30 อาชีพปัจจุบันส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 42.30 รายได้เฉลี่ย 3,001-6,000 บาท ปัญหา

สุขภาพก่อนการบำบัด ฟันผุ ร้อยละ 13.80 ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก ร้อยละ 12.20 ภาวะ  
 อาหารหรือลำไส้ผิดปกติ ร้อยละ 10.60 ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัด พบว่ามีฟันผุ ร้อยละ  
 13.80 ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก ร้อยละ 11.60 โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 6.90

**ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท  
 และกลุ่มตัวอย่าง (N = 189)**

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
บุหรี่	69	36.50
สุรา	64	33.90
ยาบ้า	18	9.50
ยานอนหลับ	8	4.20
ยาแก้ไอ	6	3.20
กัญชา	4	2.10
ยาลดความอ้วน	4	2.10
เฮโรอีน	2	1.10
กระท่อม	2	1.10
ยาเค	1	0.50
สารระเหย	1	0.50
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
ยาบ้า	149	78.80
สุรา	143	75.70
บุหรี่	136	72.00
กัญชา	70	37.00
สารระเหย	31	16.40
ยาไอซ์	18	9.50
ยาอี	15	7.90
ยานอนหลับ	13	6.90

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ยาแก้ไอ	10	5.30
ยาลดความอ้วน	10	5.30
กระท่อม	9	4.80
ยาเค	9	4.80
เฮโรอีน	7	3.70
โคเคน	3	1.60
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	177	93.70
บุหรี	149	78.80
สุรา	139	73.50
กัญชา	73	38.60
สารระเหย	27	14.30
ยานอนหลับ	25	13.20
ยาแก้ไอ	20	10.60
เฮโรอีน	18	9.50
ยาไอซ์	14	7.40
ยาอี	13	6.90
กระท่อม	11	5.80
ยาลดความอ้วน	10	5.30
ยาเค	4	2.10
โคเคน	2	1.10

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 13 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี ร้อยละ 36.50 สุรา ร้อยละ 33.90 จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิทเสพยาบ้า ร้อยละ 78.80 ดื่มสุรา ร้อยละ 75.70 และสูบบุหรี ร้อยละ 72.00 และเมื่อจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเสพยาบ้า ร้อยละ 93.70 สูบบุหรี ร้อยละ 78.80 และดื่มสุรา ร้อยละ 73.50

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด  
(N = 189)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X}$ = 17.80 , SD = 5.327, min = 8, max = 44)		
7 – 20	149	81.00
21 – 40	34	18.50
41 – 60	1	0.50
สาเหตุสำคัญที่เสพสารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	121	64.00
เพื่อนชวน	41	21.70
เพื่อความสนุกสนาน	9	4.80
เครียด/ไม่สบายใจ	7	3.70
ช่วยอาชีพ	6	3.20
เพิ่มความมั่นใจ	5	2.70
ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	135	73.40
กัญชา	32	17.40
สารระเหย	11	6.00
เฮโรอีน	6	3.20
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้ติด	103	54.50
ผู้เสพ	84	44.40
เสพติดยุติแล้ว	2	1.10
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	110	58.20
ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน	42	22.20
ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	31	16.40
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	6	3.20

## ตารางที่ 14 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
วิธีการเสพ		
สูบ	177	93.70
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	8	4.20
กิน	3	1.60
ฉีด	1	0.50
สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
เพื่อความสนุกสนาน	56	29.60
เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลไป	38	20.10
คิดใจในรสนชาติ / ฤทธิ์ยา	37	19.60
เพื่องานอาชีพ	32	16.90
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	21	11.10
เพื่อการเข้าสังคม	3	1.60
ไม่เคยคิดจะเลิก	2	1.10
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	159	84.10
มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่	67	35.40
จากสถานบันเทิง	18	9.50
แฟน/สามี/ภรรยา	15	7.90
ร้านค้า	4	2.10
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท/วัน)		
200 -300	54	28.90
300 – 500	40	21.40
> 500 ขึ้นไป	33	17.50
101 – 200	30	16.00
51 – 100	21	11.20
1 – 50	9	4.80

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตาราง 14 (ต่อ)

	ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลใกล้ชิด			
	ไม่ทราบ	95	50.30
	ทราบ	91	48.10
	ไม่แน่ใจ	3	1.60
การบำบัดรักษา			
	ไม่เคย	131	69.30
	เคย	58	30.70
ระยะเวลาอยู่บำบัด			
	1 เดือน	69	36.50
	4 เดือน	65	34.40
	2 เดือน	37	19.60
	3 เดือน	18	9.50
*คดีที่ถูกจับกุม			
	ยาบ้า	178	95.20
	กัญชา	14	7.50
	เฮโรอีน	12	6.40
	สารระเหย	10	5.30
	กระท่อม	1	0.50

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุระหว่าง 7 -20 ปี อายุเฉลี่ย 17.80 ปี (SD = 5.33) อายุต่ำสุด 8 ปี สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ อยากรอง ร้อยละ 64.00 เพื่อนชวน ร้อยละ 21.70 ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือ ยาบ้า 73.40 กัญชา ร้อยละ 17.40 ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 54.50 และผู้ติด ร้อยละ 44.40 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 58.20 และใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน ร้อยละ 22.20 โดยวิธีการสูบ ร้อยละ 93.70 สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 29.60 เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ ร้อยละ 20.10 และติดใจในรสชาติ

หรือฤทธิ์ยา ร้อยละ 19.60 แหล่งซื้อสารเสพติดจากเพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน ร้อยละ 84.10 มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่ ร้อยละ 35.40 ค่าใช้จ่ายในการเสพยาเฉลี่ย 200-300 บาท/วัน ส่วนใหญ่บุคคลใกล้ชิดไม่ทราบว่าใช้สารเสพติด ร้อยละ 50.30 และไม่เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 69.30 อยู่บำบัดเป็นเวลานาน 1 เดือน ร้อยละ 36.50 และ 4 เดือน ร้อยละ 34.40 คดีที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่คือยาบ้า ร้อยละ 95.20

**ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธ์ภาพของครอบครัว (N = 189)**

ลักษณะสัมพันธ์ภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพการครองเรือน บิดา-มารดา		
อยู่ด้วยกัน	81	42.90
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	45	23.80
บิดาถึงแก่กรรม	36	19.00
บิดามารดาถึงแก่กรรม	19	10.10
มารดาถึงแก่กรรม	8	4.20
ในกรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่		
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	19	41.50
มารดามีสามีใหม่	14	30.20
บิดามีภรรยาใหม่	11	26.40
บิดา-มารดา แยกกันอยู่โดยไม่ได้มีครอบครัวใหม่	1	1.90
*ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
บิดามารดา	68	36.20
มารดา	42	22.30
สามี / ภรรยา	32	17.00
อยู่กับญาติ	27	14.40
อยู่คนเดียว	14	7.40
เพื่อนสนิท / แฟน	11	5.90
บิดา	8	4.30

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักของบิดา		
รับจ้างทั่วไป	56	37.30
เกษตรกรกรรม	39	26.00
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	28	18.70
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	16	10.70
ว่างงาน	11	7.30
อาชีพหลักของมารดา		
รับจ้างทั่วไป	53	31.20
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	44	25.90
เกษตรกรกรรม	42	24.70
ว่างงาน	23	13.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	4	2.40
แม่บ้าน	4	2.40
รายได้ของบิดามารดา (บาท/เดือน)		
ต่ำกว่า 5,000	61	37.00
5,001 - 10,000	58	35.20
10,001 - 15,001	18	10.90
มากกว่า 20,000	18	10.90
15,001 - 20,000	10	6.10
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{X}$ = 2.40, SD = 1.471, min = 1, max = 10)		
คนเดียว	43	23.60
2 คน	85	46.10
3 คน	26	14.30
4 คน	10	5.50
5 คนขึ้นไป	18	9.70



## ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ลำดับพี่น้อง ( $\bar{X} = 1.73$ , $SD = 1.17$ , $\min = 1$ , $\max = 8$ )		
1	103	56.00
2	55	29.90
3	13	7.10
4	4	2.20
5 ขึ้นไป	9	4.80
จำนวนสมาชิกในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.18$ , $SD = 1.97$ , $\min = 1$ , $\max = 18$ )		
1 – 5 คน	151	81.50
6 – 10 คน	33	17.80
11 คนขึ้นไป	1	0.50
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	103	54.50
ผู้อาศัย	55	29.10
หัวหน้าครอบครัว	30	15.90
พี่น้อง	1	0.50
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	78	41.50
ญาติ	33	17.60
บิดา	29	15.40
สามี/ภรรยา	25	13.30
พี่น้อง	23	12.20
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	117	63.20
ทะเลาะกันบางครั้ง	58	31.40
ทะเลาะกันประจำ	10	5.20

## ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	134	70.90
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	20	10.60
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	18	9.50
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	17	9.00
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
บิดามารดา	55	29.30
มารดา	46	24.50
ญาติ	39	20.70
พี่น้อง	23	12.20
สามี/ภรรยา	14	7.40
บิดา	11	5.90

จากตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 42.90 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 23.80 กรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่ บิดามารดามีครอบครัวใหม่ ร้อยละ 41.50 พักอาศัยกับบิดามารดา ร้อยละ 36.20 สามีหรือภรรยา ร้อยละ 17.00 อาชีพหลักของบิดา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 37.30 เกษตรกรรม ร้อยละ 26.00 ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.70 อาชีพหลักมารดา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.20 ค้าขายหรือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.90 เกษตรกรรม ร้อยละ 24.70 รายได้เฉลี่ยของบิดามารดา ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จำนวนพี่น้องในครอบครัวมีพี่น้องจำนวน 2 คน ร้อยละ 46.10 เป็นลูกคนเดียว ร้อยละ 23.60 มีพี่น้องจำนวน 3 คน ร้อยละ 14.30 ลำดับพี่น้องส่วนใหญ่เป็นลูกคนแรก ร้อยละ 56.00 คนที่ 2 ร้อยละ 29.90 จำนวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่มี 1-5 คน ร้อยละ 81.50 สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ร้อยละ 54.50 ผู้อาศัย ร้อยละ 29.10 บุคคลที่ไว้วางใจคือมารดา ร้อยละ 41.50 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว ส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 63.20 ทะเลาะกันบางครั้ง ร้อยละ 31.40 ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล ร้อยละ 70.90 เมื่อมีปัญหาส่วนใหญ่มักปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบิดามารดา ร้อยละ 29.30 มารดาเพียงคนเดียว ร้อยละ 24.50 และญาติ ร้อยละ 20.70

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน

ข้อความ	$\bar{x}$	SD	ระดับ
ด้านความสัมพันธ์ภาพของครอบครัว	3.60	0.53	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.32	0.83	มาก
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน	3.30	0.59	มาก
ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ	2.45	0.38	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.58	0.53	มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธ์ภาพของครอบครัว ( $\bar{X}=3.60$ ,  $SD=0.53$ ) ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X}=3.58$ ,  $SD=0.53$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X}=3.32$ ,  $SD=0.83$ ) สภาพแวดล้อมด้านชุมชน ( $\bar{X}=3.30$ ,  $SD=0.59$ ) และมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X}=2.45$ ,  $SD=0.38$ )

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธ์ภาพของครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ (N=189)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคล ในครอบครัว	4.68	.73	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	4.58	.90	มาก
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลัวกับปัญหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	4.10	.88	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	3.98	1.0	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	3.75	1.19	มาก
เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคนในครอบครัว	3.57	1.04	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในตัวท่าน	3.46	1.19	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในตัวท่าน	3.45	.97	มาก

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.32	1.07	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวเรื่องสุขภาพของท่าน	3.22	1.24	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ภายในครอบครัว	3.08	.94	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	2.69	1.16	ปานกลาง

จากตารางที่ 17 ด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ระดับปานกลางเพียง 1 ข้อ คือ ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง ( $\bar{X} = 2.69$ ,  $SD = 1.16$ ) และในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.68$ ,  $SD = 0.73$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.58$ ,  $SD = 0.90$ ) และทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี ( $\bar{X} = 4.10$ ,  $SD = 0.88$ )

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน  
จำแนกเป็นรายชื่อ (N = 189)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ การปฏิบัติ
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	3.89	1.11	มาก
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก	3.79	1.04	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อน ที่ใช้สารเสพติด	3.70	1.17	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.62	1.10	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.54	1.33	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.52	1.26	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด	3.45	1.20	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.15	1.28	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้สารเสพติดอยู่	3.15	1.24	มาก
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเลิกเสพยาเสพติด	2.92	1.20	ปานกลาง
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.75	1.71	น้อย
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	2.22	1.14	น้อย

จากตารางที่ 18 การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่ในระดับ  
ปานกลางเพียงข้อเดียว คือ เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเลิกยาเสพติด ( $\bar{X}= 4.10$ ,  $SD = 0.88$ ) ส่วน  
ข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 3.89$ ,  
 $SD = 1.11$ ) รองลงมา คือ เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X}= 3.79$ ,  $SD = 1.04$ )  
และเมื่อมีปัญหาข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X}= 3.70$ ,  $SD = 1.17$ )

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N=189)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน		
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด	65	34.40
ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด	80	42.30
ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	121	64.40
ท่านเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกาจำหน่ายยาเสพติด	106	56.10

จากตารางที่ 19 ด้านสภาพแวดล้อมด้านชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 34.40 ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 42.30 ในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด ร้อยละ 64.40 และเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกาจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 56.10

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N= 189)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ได้	3.98	1.06	มาก
ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง	3.72	1.08	มาก
ท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด	3.49	1.20	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติดที่หาซื้อได้ง่าย	3.43	1.24	มาก
คนในละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับท่านเพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.40	1.06	มาก
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	3.29	1.06	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	3.22	1.11	มาก

ตารางที่ 20 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	3.20	1.23	มาก
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	2.94	1.08	มาก
ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	2.56	1.45	น้อย

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” ทุกข้อ ในด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยอันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนละแวกบ้านหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X} = 3.98$ ,  $SD = 1.06$ ) รองลงมา คือ ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X} = 3.72$ ,  $SD = 1.08$ ) และท่านมักไปในสถานที่มั่วสุ่มยาเสพติด ( $\bar{X} = 3.49$ ,  $SD = 1.20$ )

ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายข้อ (N = 189)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความ คิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.16	1.11	มาก
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	3.14	1.10	มาก
ท่านเชื่อว่าคุณสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	3.13	1.07	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ	2.65	.99	มาก
ท่านเชื่อว่าคุณไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.62	1.42	มาก
เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.38	1.10	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าจะไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.19	1.09	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.10	1.01	น้อย

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่ต้องเข้าสถานบำบัด	1.12	1.17	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน	2.10	1.03	น้อย

จากตารางที่ 21 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” เพียง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.16$ ,  $SD = 1.11$ ) รองลงมา คือ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 3.14$ ,  $SD = 1.10$ ) และท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 3.13$ ,  $SD = 1.07$ ) และเลือก ระดับ “ตรงกับความเป็นจริงน้อย” เพียง 1 ข้อ คือ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน ( $\bar{X} = 2.10$ ,  $SD = 1.03$ )

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายข้อ (N =189)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.34	0.84	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.07	0.99	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	3.99	1.16	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง	3.95	1.06	มาก
ครอบครัว สังคม			
สังคมไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	3.93	0.93	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.77	1.10	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งโก้ เก๋ ทันสมัย	3.74	1.02	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียุติพลต่อข้าพเจ้า	3.56	1.09	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพยาเสพติด	3.55	0.93	มาก



ตารางที่ 22 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.46	1.16	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.40	0.96	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.29	1.21	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.22	1.08	มาก
การเสพยาเสพติดช่วยแก้แอกการเงินอายุได้	3.13	1.18	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.66	1.07	ปานกลาง

จากตารางที่ 22 ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เพียงข้อเดียว นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่อยู่ในระดับปานกลางข้อเดียว คือ การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้ ( $\bar{X} = 2.66$ ,  $SD = 1.07$ ) ส่วนข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือการเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X} = 4.34$ ,  $SD = 0.84$ ) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.07$ ,  $SD = 0.99$ ) และข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 3.99$ ,  $SD = 1.16$ )

## 2.2 ศูนย์บำบัดรักษาเสพยาเสพติดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ 23 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 50)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	46	92.00
หญิง	4	8.00
อายุ (ปี) ( $\bar{X} = 31.58$ , $\min = 16$ , $\max = 67$ )		
12 - 20	7	14.58
21 - 40	30	62.50
41 - 60	10	20.83
61 - 67	1	2.08

## ตารางที่ 23 (ต่อ)

	ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
ศาสนา			
	พุทธ	46	92.00
	คริสต์	4	8.00
สถานภาพ			
	โสด	28	57.10
	สมรส	16	32.70
	หย่าร้าง	3	6.10
	แยกกันอยู่	1	2.00
	หม้าย	1	2.00
ระดับการศึกษา			
	ไม่ได้เรียนหนังสือ	10	20.00
	ประถมศึกษา	22	44.00
	มัธยมศึกษา/ปวช.	17	34.00
	ปริญญาตรี	1	2.00
อาชีพปัจจุบัน			
	รับจ้างทั่วไป	25	50.00
	เกษตรกรกรรม	13	26.00
	นักเรียน / นักศึกษา	5	10.00
	ว่างงาน	4	8.00
	ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย	2	4.00
	คาราโอเกะ	1	2.00
รายได้ต่อเดือน (บาท)			
	ไม่มีรายได้	8	16.00
	1 - 3,000	23	46.00
	3,001 – 6,000	12	24.00
	6,001 – 10,000	5	10.00
	10,001 – 15,000	1	2.00
	> 15,000	1	2.00

## ตารางที่ 23 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด</b>		
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	11	22.00
โรคผิวหนัง	7	14.00
ฟันผุ	2	4.00
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	2	4.00
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	2	4.00
ไมเกรน	1	2.00
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	1	2.00
<b>*ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัด</b>		
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	11	22.00
โรคผิวหนัง	5	10.00
ฟันผุ	4	8.00
ไมเกรน	3	6.00
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	2	4.00
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	2	4.00
<b>อาการทางจิต</b>		
anxiety disorder	1	2.00
Depressive disorder	1	2.00
Schizophrenia disorder	1	2.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.50 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 31.58 ปี ร้อยละ 92.00 เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.00 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 8.0 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.10 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 32.70 สมรส ร้อยละ 6.10 หย่าร้าง การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 44.00 รองลงมาระดับมัธยม/ปวช. ร้อยละ 34.00 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 50.00 เกษตรกรรม ร้อยละ 26.00 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 10.00 มีระดับรายได้เฉลี่ย 1-3,000 บาทต่อเดือน

ปัญหาสุขภาพก่อนและระหว่างการรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.00 มี  
ปัญหาปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก โรคผิวหนัง ร้อยละ 14.00 และ 10.00 ตามลำดับ พันผุ ร้อยละ  
4.00 และ 8.00 ตามลำดับ

อาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด พบ Anxiety disorder, Depressive disorder  
และ Schizophrenia disorder ร้อยละ 2.00

**ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท  
และกลุ่มตัวอย่าง**

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
บุหรี	12	24.00
สุรา	11	22.00
ยานอนหลับ	1	2.00
ยาแก้ไอ	1	2.00
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
บุหรี	18	36.00
สุรา	18	36.00
ยาบ้า	14	28.00
กัญชา	3	6.00
สารระเหย	2	4.00
ยานอนหลับ	2	4.00
ยาแก้ไอ	2	4.00
ฝิ่น	3	6.00
ยาอี	1	2.00
เฮโรอีน	1	2.00

ตารางที่ 24 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
บุหรี	35	70.00
ยาบ้า	32	64.00
สุรา	31	62.00
กัญชา	9	18.00
ฝิ่น	8	16.00
เฮโรอีน	4	8.00
สารระเหย	3	6.00
ยานอนหลับ	3	6.00
ยาแก้ไอ	2	4.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใช้บุหรี ร้อยละ 24.00 ยานอนหลับและยาแก้ไอ ร้อยละ 2.00 เมื่อจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า เพื่อนสนิทของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรีและดื่มสุรา ร้อยละ 28.00 เสพยาบ้า ร้อยละ 28.00 และจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สูบบุหรี ร้อยละ 70.00 เสพยาบ้า ร้อยละ 64.00 ดื่มสุรา ร้อยละ 62.00

ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด

(N = 50)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X}$ = 21.86, SD = 7.60, min = 9, max = 45)		
7 – 20	29	58.00
21 – 40	20	40.00
41 – 60	1	2.00

## ตารางที่ 25 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	26	52.00
เพื่อนชวน	17	34.00
เครียด / ไม่สบายใจ	4	8.00
ช่วยอาชีพ	3	6.00
ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	30	61.20
ฝิ่น	9	18.40
กัญชา	6	12.00
สารระเหย	2	4.10
เฮโรอีน	1	2.00
ยาอี	1	2.00
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้เสพ	44	88.00
ผู้ติด	6	12.00
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	42	85.70
ใช้เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน	3	6.10
ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	3	6.10
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	1	2.00
วิธีการเสพ		
สูบ	46	92.00
กิน	3	6.00
ฉีด	1	2.00

## ตารางที่ 25 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
เพื่องานอาชีพ	19	38.00
จิตใจในรสชาติ / ฤทธิ์ยา	12	24.00
เพื่อความสนุกสนาน	11	22.00
เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ	6	12.00
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	1	2.00
ไม่เคยคิดจะเลิก	1	2.00
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	37	74.00
มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่	15	30.00
จากสถานบันเทิง	2	4.00
จากร้านค้า	2	4.00
แฟน / สามี / ภรรยา	1	2.00
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท / วัน)		
101 – 200	15	31.90
51 – 100	10	21.30
1 – 50	9	19.10
200 – 300	9	19.10
300 – 500	3	6.40
> 500	1	2.10
บุคคลใกล้ชิด		
ไม่ทราบ	31	63.30
ทราบ	18	36.70

\* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 25 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
การบำบัดรักษา		
ไม่เคย	46	92.00
เคย	4	8.00
ระยะเวลาขณะบำบัด		
4 เดือน	27	58.70
1 เดือน	18	39.10
2 เดือน	1	2.20
*คดีที่ถูกจับกุม		
ยาบ้า	37	74.00
ฝิ่น	12	24.00
กัญชา	1	2.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 21.86 ปี (SD = 7.60) อายุต่ำสุด 9 ปี สาเหตุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ อยากรอง ร้อยละ 52.00 เพื่อนชวน ร้อยละ 34.00 เครียด/ไม่สบายใจ ร้อยละ 8.00 ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก ยาบ้า ร้อยละ 61.20 ฝิ่น ร้อยละ 18.40 กัญชา ร้อยละ 12.00 ผู้เสพ ร้อยละ 88.00 ผู้ติด ร้อยละ 12.00 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน คือ ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 85.70 ใช้เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 6.10 และใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือเกือบทุกสัปดาห์ ร้อยละ 6.10 วิธีการเสพโดยการสูบ ร้อยละ 92.00 กิน ร้อยละ 6.00 และฉีด ร้อยละ 2.00 สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน เพื่องานอาชีพ ร้อยละ 38.00 ตัดใจในรชชาติหรืออุทธียา ร้อยละ 24.00 เพื่อความ เพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 22.00 แห่่งซื้อยาเสพติดจากเพื่อนที่ใช้ยาเสพติดด้วยกัน ร้อยละ 74.00 มีผู้จำหน่ายให้ถึงที่ ร้อยละ 30.00 จากสถานบันเทิงและร้านค้า ร้อยละ 4.00 ค่าใช้จ่ายในการเสพยา 101 -200 บาทต่อวัน บุคคลใกล้ชิดส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้สารเสพติด ร้อยละ 63.30 ที่ทราบเพียงร้อยละ 36.70 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยบำบัดรักษามาก่อน ร้อยละ 92.00 เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 8.00 ระยะเวลาบำบัดขณะตอบแบบสอบถามอยู่นาน 4



เดือน ร้อยละ 58.70 รองลงมารักษายู่นาน 1 เดือน ร้อยละ 39.10 คดีที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นคดี ยาบ้าร้อยละ 74.00 รองลงมาคดียาเสพติดอื่นร้อยละ 24.00

**ตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อม และลักษณะสัมพันธภาพ ของครอบครัว (N = 50)**

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพการครองเรือน บิดา- มารดา		
อยู่ด้วยกัน	20	40.00
บิดาถึงแก่กรรม	11	22.00
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	8	16.00
บิดามารดาถึงแก่กรรม	8	16.00
มารดาถึงแก่กรรม	3	6.00
กรณีที่เป็นบิดามารดาแยกกันอยู่		
มารดามีสามีใหม่	4	50.00
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	3	37.50
บิดามีภรรยาใหม่	1	12.50
ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
บิดามารดา	15	30.00
สามี/ภรรยา	15	30.00
มารดา	12	24.00
คนเดียว	3	6.00
ญาติ	3	6.00
เพื่อนสนิท/แฟน	2	4.00
อาชีพหลักบิดา		
เกษตรกรกรรม	17	44.70
รับจ้างทั่วไป	12	31.60
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	4	10.50
ว่างงาน	3	7.90
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	2	5.30

## ตารางที่ 26 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักมารดา		
เกษตรกรรม	15	34.90
รับจ้างทั่วไป	13	30.20
ว่างงาน	9	20.90
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	5	9.30
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	2	4.60
รายได้ของบิดามารดา (บาท/เดือน)		
ต่ำกว่า 5,000	26	60.50
5,001 – 10,000	13	30.20
15,001 – 20,000	3	7.00
10,001 – 15,000	1	2.30
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{x} = 4.19$ , $SD = 2.26$ , $min = 1$ , $max = 10$ )		
คนเดียว	3	6.40
2 คน	11	23.40
3 คน	6	12.80
4 คน	11	23.40
5 คนขึ้นไป	16	34.00
ลำดับพี่น้อง ( $\bar{x} = 2.64$ , $SD = 1.674$ , $min = 1$ , $max = 8$ )		
1	14	29.80
2	13	27.70
3	7	14.90
4	8	17.00
5 คนขึ้นไป	5	10.60
จำนวนสมาชิกที่ท่านอาศัยอยู่ ( $\bar{x} = 4.26$ , $SD = 2.39$ , $min = 1$ , $max = 13$ )		
1 – 5 คน	37	78.70
6 – 10 คน	9	19.10
11 คนขึ้นไป	1	2.10

## ตารางที่ 26 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	20	40.00
ผู้อาศัย	17	34.00
หัวหน้าครอบครัว	13	26.00
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	19	38.00
สามี/ภรรยา	12	24.00
บิดา	11	22.00
ญาติที่พักอาศัยด้วย	6	12.00
พี่/น้อง	2	4.00
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	33	67.30
ทะเลาะกันบางครั้ง	14	28.60
ทะเลาะกันเป็นประจำ	2	4.00
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	38	76.00
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	6	12.00
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	4	8.00
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	2	4.00
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
บิดามารดา	15	30.00
มารดา	12	24.00
พี่/น้อง	9	18.00
ญาติ	4	8.00
บิดา	3	6.00
สามี/ภรรยา	7	14.00

จากตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาด้านสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 40.00 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 16.00 ในกรณีแยกกันอยู่ มารดามีสามีใหม่ ร้อยละ 50.00 บิดาและมารดามีสามีใหม่ ร้อยละ 37.50 และบิดามีภรรยาใหม่ ร้อยละ 12.00 ที่พักอาศัยในปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดามารดาและสามีหรือภรรยา ร้อยละ 30.00 บิดามีอาชีพหลักเกษตรกรรม ร้อยละ 44.70 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.60 มารดามีอาชีพหลักเกษตรกรรม ร้อยละ 34.90 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.20 ว่างาน ร้อยละ 20.90 รายได้เฉลี่ยของบิดามารดาต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน จำนวนพี่น้อง 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 34.00 จำนวน 2 และ 4 คน ร้อยละ 23.40 ลำดับพี่น้องในครอบครัว ลำดับแรก ร้อยละ 29.80 ลำดับที่ 2 ร้อยละ 27.70 และลำดับที่ 4 ร้อยละ 17.00 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน ร้อยละ 78.70 เฉลี่ย 4.26 คน (SD=2.39) ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 40.00 ผู้อาศัย ร้อยละ 34.00 หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 26.00 บุคคลที่ไว้ใจลำดับแรก คือ มารดา ร้อยละ 38.00 สามีหรือภรรยา ร้อยละ 24.00 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 63.70 การเลี้ยงดูของครอบครัวแบบใช้เหตุผล ร้อยละ 76.00 เข้มงวดกวดขัน ร้อยละ 12.00 การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จากบิดามารดา ร้อยละ 30.00 มารดาเพียงคนเดียว ร้อยละ 24.00 พี่หรือน้อง ร้อยละ 18.00

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.67	0.57	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.85	0.50	มาก
สภาพแวดล้อม ชุมชน	3.76	0.36	มาก
ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ	2.61	0.38	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.83	0.51	มาก

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.61, SD = 0.38$ ) และในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.83, SD = 0.50$ )

ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.83, SD = 0.51$ ) ด้านสภาพแวดล้อมด้านชุมชน ( $\bar{X} = 3.76, SD = 0.36$ ) ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.61, SD = 0.38$ )

**ตารางที่ 28** ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ (N= 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่าง ท่านกับบุคคลในครอบครัว	4.96	0.71	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	4.10	0.97	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	3.98	0.94	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.80	0.97	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคคนในครอบครัว	3.71	1.08	มาก
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลุ่มใจกับปัญหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด	3.58	1.07	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในตัวท่าน	3.55	0.96	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ภายในครอบครัว	3.22	1.11	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัว เมื่อมีเวลาว่าง	2.90	1.28	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลุ่มใจเรื่องสุขภาพ ของท่าน	2.70	1.30	มาก

จากตารางที่ 28 พบว่า ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.96, SD = 0.71$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.61, SD = 0.71$ ) บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา ( $\bar{X} = 4.10, SD = 0.97$ )

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน  
จำแนกเป็นรายชื่อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก	4.30	0.93	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านกลับไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ ใช้สารเสพติด	4.29	1.04	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	4.27	0.84	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	4.26	0.88	มาก
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	4.14	0.87	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้สารเสพติด	3.98	0.94	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด	3.96	0.87	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.94	0.83	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	3.94	1.02	มาก
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	3.57	1.12	มาก
กลุ่มเพื่อนที่คบไม่เสพยาเสพติด	3.18	1.02	มาก
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเลิกเสพยาเสพติด	2.88	1.17	มาก

จากตารางที่ 29 พบว่า การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X} = 4.30$ ,  $SD = 0.93$ ) รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านกลับไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 4.29$ ,  $SD = 1.04$ ) และ เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ ( $\bar{X} = 4.27$ ,  $SD = 0.84$ )

ตารางที่ 30 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N = 50)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
<b>*สภาพแวดล้อมด้านชุมชน</b>		
ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือไม่	42	84.00
ท่านเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่	4	8.00
ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่	3	6.00
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด	2	4.00

\* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 30 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน พบว่า ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 84.00 กลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 8.00 ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 6.00 สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 4.00

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนจำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	4.61	0.67	มาก
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	4.54	0.58	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	4.32	0.65	มาก
ท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด	4.26	0.94	มาก
ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง	3.90	1.00	มาก
ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ได้	3.86	1.13	มาก
คนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงาน) ไม่ยอมรับท่านเพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.60	1.11	มาก

ตารางที่ 31 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	3.36	1.29	มาก
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	3.04	1.23	มาก
ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	2.26	1.70	ปานกลาง

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” ในด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 4.61$ ) รองลงมา คือ ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย ( $\bar{X} = 4.54$ ,  $SD = 0.58$ ) บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 4.32$ ,  $SD = 0.65$ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” คือ ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน ( $\bar{X} = 2.26$ ,  $SD = 1.70$ )

ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ  
จำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	3.52	0.86	มาก
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.39	1.00	มาก
ท่านเชื่อว่าคุณสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	3.12	1.08	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ	3.06	0.87	มาก
ท่านเชื่อว่าคุณไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	3.00	1.14	มาก



ตารางที่ 32 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งทำให้			
เข้มแข็งขึ้น	2.38	0.95	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ในชุมชน	2.38	0.86	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.08	0.97	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.06	1.29	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้า สถานบำบัด	1.24	1.27	น้อย

จากตารางที่ 32 ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X}=3.52, SD=0.86$ ) ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X}=3.39, SD=1.00$ ) ท่านเชื่อที่ท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X}=3.12, SD=1.08$ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงน้อย” เพียงข้อเดียว คือ การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสถานบำบัด ( $\bar{X}=1.24, SD=1.27$ )

ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด  
จำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.62	0.53	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.42	0.81	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง			
ครอบครัว สังคม	4.20	0.88	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่โก่งก้นทันสมัย	4.14	0.84	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	4.00	1.35	มาก
สังคมไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	3.96	1.01	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.90	1.13	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพยาเสพติด	3.88	1.04	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มึนทึบต่อข้าพเจ้า	3.84	0.99	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.71	1.13	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.69	1.12	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.60	1.11	มาก
การเสพยาเสพติดช่วยแก้แอกการเงินอายุได้	3.56	0.99	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.52	1.09	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.98	1.09	มาก

จากตารางที่ 33 ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X} = 4.62$ ,  $SD = 0.53$ ) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.42$ ,  $SD = 0.81$ ) และการเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ( $\bar{X} = 4.20$ ,  $SD = 0.88$ )

## 2.3 สถาบันบุญญารักษ์

ตารางที่ 34 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 402)

ข้อมูลส่วนบุคคล		จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
	ชาย	263	65.60
	หญิง	138	34.40
อายุ (ปี) ( $\bar{X} = 27.28$ , min = 14, max = 58)			
	12 – 20	88	21.89
	21 – 40	286	71.14
	41 – 60	28	6.97
ศาสนา			
	พุทธ	366	91.30
	อิสลาม	31	7.70
	คริสต์	4	1.00
สถานภาพ			
	โสด	229	57.10
	สมรส	104	25.90
	แยกกันอยู่	41	10.20
	หย่าร้าง	19	4.70
	หม้าย	8	2.00
ระดับการศึกษา			
	ไม่ได้เรียน	21	5.20
	ประถมศึกษา	172	42.80
	มัธยมศึกษา / ปวช.	195	48.50
	อนุปริญญา / ปวส.	12	3.00
	ปริญญาตรี	2	0.50

ตารางที่ 34 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพปัจจุบัน		
รับจ้างทั่วไป	183	45.50
ว่างงาน	116	28.90
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	51	12.70
นักเรียน/นักศึกษา	17	4.20
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	11	2.70
เกษตรกรรวม	11	2.70
แม่บ้าน	8	2.00
คาราโอเกะ	3	0.70
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	0.50
รายได้ (บาท/เดือน)		
ไม่มีรายได้	112	27.86
1 – 3,000	40	9.95
3,001 – 6,000	111	27.61
6,001 – 10,000	108	26.87
10,001 – 15,000	19	4.73
> 15,000	9	2.24
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด		
ฟันผุ	99	24.60
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	48	11.90
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	48	11.90
ไมเกรน	24	6.00
กระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ	18	4.50
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	16	4.00
โรคผิวหนัง	15	3.70
โรคหัวใจ ความดัน	13	3.20

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 34 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
โลหิตจาง	8	2.00
โรคลมชัก	4	1.00
วัณโรค	3	0.70
โรคตับ	1	0.20
เบาหวาน	1	0.20
<b>*ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัด</b>		
ฟันผุ	98	24.40
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	50	12.40
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	37	9.20
ไมเกรน	22	5.50
โรคผิวหนัง	20	5.00
อื่น ๆ	17	4.20
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	12	3.00
โรคหัวใจ	9	2.20
โลหิตจาง	3	0.70
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	3	0.70
โรคลมชัก	3	0.70
วัณโรค	2	0.50
เบาหวาน	2	0.50
โรคตับ	1	0.20
<b>*อาการทางจิต</b>		
Inorganic insomnia	6	1.50
Acute psychosis	3	0.70
Substance induces psychosis disorder	3	0.70
Adjustment disorder	2	0.50
Bipolar disorder	1	0.20

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.14 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย ปี เพศชาย ร้อยละ 65.60 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.30 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.10 สมรส ร้อยละ 25.90 แยกกันอยู่ร้อยละ 10.20 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 48.50 ประถมศึกษา ร้อยละ 42.80 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 5.20 อาชีพปัจจุบันส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 45.50 ว่างาน ร้อยละ 28.90 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.86

ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด มีพิษ ร้อยละ 24.60 โรกระบบทางเดินหายใจ ปวดข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 11.90 ในระหว่างการบำบัดมีปัญหาพิษ ร้อยละ 24.40 ปวดข้อ กล้ามเนื้อ และกระดูก ร้อยละ 12.40 โรกระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 9.20

อาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด พบ Inorganic insomnia ร้อยละ 1.50 Acute psychosis และ Substance induces psychosis disorder ร้อยละ 0.70

**ตารางที่ 35 จำนวนและร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มตัวอย่าง (N = 402)**

ชนิดของสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
บุหรี	169	42.00
สุรา	142	35.30
ยาบ้า	50	12.50
กระท่อม	21	5.20
ยาแก้ไอ	18	4.50
กัญชา	15	3.70
ยาลดความอ้วน	14	3.50
สารระเหย	11	2.70
ยานอนหลับ	10	2.50
ยาไอซ์	6	1.50
ยาอี	3	0.70
ยาเค	2	0.50

## ตารางที่ 35 (ต่อ)

ชนิดของสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
ยาบ้า	246	61.20
บุหรี	238	59.20
สุรา	211	52.50
กัญชา	126	31.30
ยาไอซ์	69	17.20
สารระเหย	46	11.40
ยาแก้ไอ	36	9.00
ยาลี	36	9.00
กระท่อม	34	8.50
เฮโรอีน	21	5.20
ยานอนหลับ	19	4.70
ยาลดความอ้วน	19	4.70
โคเคน	14	3.50
ยาเค	10	4.90
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	393	97.80
บุหรี	321	79.90
สุรา	233	58.00
กัญชา	128	31.80
ยาไอซ์	82	20.40
ยาแก้ไอ	60	14.90
สารระเหย	50	12.40
ยานอนหลับ	37	9.20
กระท่อม	33	8.20
ยาลี	28	7.00
เฮโรอีน	21	5.20

## ตารางที่ 35 (ต่อ)

ชนิดของสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
ขาดความอ้วน	18	4.50
ยาเค	10	2.50
โคเคน	8	2.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 35 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ ร้อยละ 42.00 ดื่มสุรา ร้อยละ 35.30 ยาบ้า ร้อยละ 12.50 จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า เสพยาบ้า ร้อยละ 61.20 สูบบุหรี่ ร้อยละ 59.20 ดื่มสุรา ร้อยละ 52.50 และจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เสพยาบ้า ร้อยละ 97.80 สูบบุหรี่ ร้อยละ 79.90 ดื่มสุรา ร้อยละ 58.00

## ตารางที่ 36 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด (N = 402)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X}$ = 18.70, SD = 5.55, min = 7, max = 45)		
7 – 20	306	77.86
21 – 40	84	21.37
41 – 60	3	0.76
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	253	63.40
เพื่อนชวน	78	19.50
เครียด/ไม่สบายใจ	28	7.00
ช่วยอาชีพ	21	5.00
เพื่อความสนุกสนาน	16	4.00
เพิ่มความมั่นใจ	3	0.80



## ตารางที่ 36 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	300	76.90
กัญชา	46	11.80
สารระเหย	29	7.40
เฮโรอีน	6	1.50
ยาไอซ์	5	1.30
ยาอี	2	0.50
ยาเค	2	0.50
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้เสพ	260	64.80
ผู้ติด	131	32.70
เสพยาครั้งรุนแรง	10	2.50
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	199	49.60
ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน	177	29.20
ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	75	18.70
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	10	2.50
วิธีการเสพ		
สูบ	376	93.50
กิน	12	3.00
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	12	3.00
ฉีด	2	0.50
สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
เพื่อความสนุกสนาน	149	37.50
เพื่องานอาชีพ	81	20.40
เพื่อลดความเครียดหรือกังวลใจ	78	19.60
ติดใจในรสชาติ, ฤทธิ์ยา	55	13.90

## ตารางที่ 36 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	10	2.50
เพื่อการเข้าสังคม	11	2.77
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	7	1.76
ไม่เคยคิดจะเลิก	6	1.51
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	330	82.10
มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่	150	37.30
จากสถานบันเทิง	26	6.50
แฟน/สามี/ภรรยา	24	6.00
จากร้านค้า	4	1.00
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท / วัน)		
200 – 300	147	36.66
> 500	103	25.69
300 – 500	80	19.95
101 – 200	45	11.22
51 – 100	18	4.49
1 – 50	8	2.00
บุคคลใกล้ชิด		
ทราบ	227	56.75
ไม่ทราบ	167	41.75
ไม่แน่ใจ	6	1.50
การบำบัดรักษา		
ไม่เคย	304	75.60
เคย	98	24.40

ตารางที่ 36 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเวลาขณะบำบัด		
1 เดือน	137	34.60
4 เดือน	116	29.30
3 เดือน	75	18.90
2 เดือน	68	17.20
*คดีที่ถูกจับกุม		
ยาบ้า	393	97.80
กัญชา	20	5.00
ยาไอซ์	9	2.20
เฮโรอีน	6	1.50
กระท่อม	1	0.20

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 58 พบว่า จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 18.70 ปี (SD = 5.55) อายุต่ำสุด 7 ปี สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ อยากรอง ร้อยละ 63.40 เพื่อนชวน ร้อยละ 19.50 และเครียด/ไม่สบายใจร้อยละ 7.00 ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก ยาบ้า ร้อยละ 76.90 กัญชา ร้อยละ 11.80 สารระเหย ร้อยละ 7.40 ประเภทของผู้ป่วยเป็นผู้เสพ ร้อยละ 64.80 ผู้ติด 32.70 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 49.60 ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน ร้อยละ 29.20

ตารางที่ 37 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพ  
ของครอบครัว (N = 402)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพการครองเรือน บิดา มารดา		
อยู่ด้วยกัน	154	38.70
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	123	30.90
บิดาถึงแก่กรรม	66	16.60
บิดามารดาถึงแก่กรรม	32	8.00
มารดาถึงแก่กรรม	23	5.80
ในกรณีบิดามารดาแยกกันอยู่		
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	65	41.90
บิดามีภรรยาใหม่	43	27.70
มารดามีสามีใหม่	23	23.20
แยกกันอยู่โดยไม่มีครอบครัวใหม่	11	7.10
*ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
บิดามารดา	111	27.80
สามี/ภรรยา	96	24.10
มารดา	82	20.60
ญาติ	69	17.30
อยู่คนเดียว	24	6.00
บิดา	23	5.80
เพื่อน/แฟน	20	5.00
อาชีพหลักบิดา		
รับจ้างทั่วไป	157	44.50
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	71	20.10
ว่างงาน	56	15.50
เกษตรกรรม	37	10.50
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	33	9.30

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 37 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักมารดา		
รับจ้างทั่วไป	135	36.00
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	123	32.80
ว่างงาน	47	12.50
เกษตรกรรม	36	9.60
แม่บ้าน	24	6.40
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	10	2.70
รายได้ของบิดามารดา		
5,001 – 10,000	135	35.90
ต่ำกว่า 5,000	111	29.50
10,001 – 15,000	52	13.80
> 5,000	46	12.20
15,001 – 20,000	32	8.50
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{x} = 3.03, SD = 1.92, \min = 1, \max = 13$ )		
คนเดียว	68	17.44
2 คน	119	30.51
3 คน	95	24.36
4 คน	49	12.56
5 คน ขึ้นไป	59	15.13
ลำดับพี่น้องในครอบครัว ( $\bar{x} = 2.13, SD = 1.92, \min = 1, \max = 11$ )		
1	179	44.50
2	101	25.60
3	60	15.20
4	26	6.60
5 ขึ้นไป	28	7.20

ตารางที่ 37 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนสมาชิกในครอบครัว ( $\bar{x} = 5.01$ , $SD = 2.68$ , $\min = 1$ , $\max = 18$ )		
1 – 5 คน	379	96.10
6 – 10 คน	27	3.60
11 คนขึ้นไป	1	0.30
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	233	58.50
ผู้อาศัย	110	27.60
หัวหน้าครอบครัว	51	12.80
หาเลี้ยงครอบครัว	4	1.00
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	167	41.96
ญาติที่พักอาศัยด้วยหรือเลี้ยงดู	70	17.59
บิดา	62	15.58
สามี/ภรรยา	57	14.32
พี่น้อง	42	10.55
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	241	60.86
ทะเลาะกันบางครั้ง	126	31.82
ทะเลาะกันประจำ	29	7.32
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	284	71.70
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	49	12.40
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	36	9.10
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	27	6.80

ตารางที่ 37 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
การปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือ		
มารดา	111	27.90
บิดามารดา	72	18.10
พี่/น้อง	71	17.80
บุคคลที่เลี้ยงดูหรือให้พักอาศัย	66	16.60
สามี/ภรรยา	55	13.80
บิดา	23	5.80

จากตารางที่ 37 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาด้านสัมพันธภาพของครอบครัวพบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาอยู่ด้วยกันร้อยละ 38.70 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 30.90 บิดาถึงแก่กรรม ร้อยละ 16.60 ในกรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่บิดาและมารดามีครอบครัวใหม่ ร้อยละ 41.90 บิดามีภรรยาใหม่ ร้อยละ 27.70 มารดามีสามีใหม่ ร้อยละ 23.20 ที่พักอาศัยในปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 27.80 สามีหรือภรรยา ร้อยละ 24.10 อยู่กับมารดา ร้อยละ 20.60 อาชีพหลักบิดารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.50 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.10 ว่างาน ร้อยละ 15.50 อาชีพหลักมารดา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.00 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.80 ว่างาน ร้อยละ 12.50 รายได้ของบิดามารดาเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท/เดือน จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน 2 คน ร้อยละ 30.51 รองลงมา 3 คน ร้อยละ 24.36 และคนเดียว ร้อยละ 17.44 ลำดับพี่น้องในครอบครัวเป็นคนแรก ร้อยละ 44.50 ลำดับที่ 2 ร้อยละ 25.60 ลำดับที่ 3 ร้อยละ 15.20 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน ร้อยละ 96.10 เฉลี่ย 5.01 คน (SD = 2.68) รองลงมา 6-10 คน ร้อยละ 3.60 และ 11 คนขึ้นไป ร้อยละ 0.30 สถานภาพในครอบครัวเป็นสมาชิก ร้อยละ 57.50 ผู้อาศัย ร้อยละ 27.60 หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 12.80 บุคคลในกลุ่มตัวอย่างไว้วางใจ มารดา ร้อยละ 41.96 ญาติที่ให้ที่พักอาศัยหรือเลี้ยงดู ร้อยละ 17.59 บิดา ร้อยละ 15.58 สัมพันธภาพระหว่างพี่น้องในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 60.86 ทะเลาะกันบางครั้ง ร้อยละ 31.82 ทะเลาะกันประจำ ร้อยละ 7.32 การเลี้ยงดูของครอบครัวเลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล ร้อยละ 71.70 เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง 12.40 เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน ร้อยละ 9.10 การปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากมารดา ร้อยละ 27.90 บิดาและมารดา 18.10 พี่หรือน้อง ร้อยละ 17.80

ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.62	0.53	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.45	0.77	มาก
ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชน	3.34	0.64	มาก
ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ	2.54	0.39	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.80	0.51	มาก

จากตารางที่ 38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.54$ ,  $SD = 0.39$ ) และในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.80$ ,  $SD = 0.51$ ) ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ( $\bar{X} = 3.62$ ,  $SD = 0.53$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.45$ ,  $SD = 0.77$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.41$ ,  $SD = 0.78$ )

ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายข้อ (N = 402)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่าน กับบุคคลในครอบครัว	4.68	0.76	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	4.55	0.90	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	3.98	0.92	มาก
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลัวกับปัญหาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	3.91	1.11	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	4.68	0.76	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในท่าน	3.57	1.01	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.55	0.97	มาก



ตารางที่ 39 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคนในครอบครัว	3.51	1.19	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ภายในครอบครัว	3.08	0.98	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวใจเรื่องสุขภาพของท่าน ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัว	2.85	1.27	มาก
เมื่อมีเวลาว่าง	2.97	1.19	มาก

จากตารางที่ 39 พบว่า ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.68$ ,  $SD = 0.76$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.55$ ,  $SD = 0.90$ ) และทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี ( $\bar{X} = 9.98$ ,  $SD = 0.92$ )

ตารางที่ 40 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน  
จำแนกเป็นรายข้อ (N = 402)

ข้อความ	$\bar{x}$	SD	ระดับ การปฏิบัติ
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	4.12	1.01	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.95	1.08	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด	3.90	1.15	มาก
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก	3.85	1.10	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อน ไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติดอีก	3.77	1.09	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.70	1.20	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.56	1.29	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.36	1.27	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	3.16	1.20	มาก

ตารางที่ 40 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{x}$	SD	ระดับ การปฏิบัติ
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	2.63	1.16	มาก
เพื่อนสนิทของท่านชักชวนให้ท่านเสพยาเสพติด	2.91	1.27	มาก
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.72	1.09	มาก

จากตารางที่ 40 พบว่า การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 4.12$ ,  $SD = 1.01$ ) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ( $\bar{X} = 3.95$ ,  $SD = 1.08$ ) และเมื่อมีปัญหาต้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 3.90$ ,  $SD = 1.15$ )

ตารางที่ 41 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N = 402)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน		
ที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้ที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด	188	47.20
ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด	240	60.30
ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	202	51.10
ท่านเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกิจการจำหน่ายยาเสพติด	228	57.30

จากตารางที่ 41 ด้านสภาพแวดล้อมด้านชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 47.20 ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 60.30 ในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ร้อยละ 51.10 และกลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกิจการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 57.30

ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N = 402)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ได้ โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติด อย่างจริงจัง	4.01	1.16	มาก
ท่านมักไปในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่	3.88	1.10	มาก
ท่านมักไปในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ คนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงาน) ไม่ยอมรับท่าน เพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.65	1.25	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติด ที่หาซื้อได้ง่าย	3.57	1.16	มาก
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	3.41	1.29	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	3.41	1.29	มาก
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	3.05	1.33	มาก
ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	3.03	1.35	มาก
	2.69	1.56	มาก

จากตารางที่ 42 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ ตรงกับความเป็นจริงจากทุกข้อในด้านสิ่งแวดล้อมด้านชุมชนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยอันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้าน เพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X}= 4.01$ , SD = 1.16) รองลงมา คือ โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X}= 3.88$ , SD = 1.10) และท่านมักไปในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ ( $\bar{X}= 3.65$ , SD = 1.25)

ตารางที่ 43 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนก เป็นรายข้อ (N = 402)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	3.34	1.03	มาก
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูก กำหนดไว้แล้ว	3.25	1.13	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	3.19	1.02	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.80	1.31	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ด้านจิตใจ	2.75	0.98	มาก
เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่ง ทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.52	1.03	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.24	1.18	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ในชุมชน	2.21	1.04	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.14	1.05	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่ต้องเข้า สถานบำบัด	1.03	1.17	น้อย

จากตารางที่ 43 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติด เราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 3.34$ ,  $SD = 1.03$ ) รองลงมา คือท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.25$ ,  $SD = 1.13$ ) และท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 3.19$ ,  $SD = 1.02$ )

กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” ในหัวข้อ เมื่อเจอปัญหาหรือ เรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น ( $\bar{X} = 2.52$ ,  $SD = 1.03$ ) รองลงมา คือ การ

ใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา ( $\bar{X} = 2.24, SD = 1.18$ ) และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกันคนส่วนใหญ่ในชุมชน ( $\bar{X} = 2.21, SD = 1.04$ )

กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงน้อย” ในหัวข้อการติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่ต้องเข้าสถานบำบัด ( $\bar{X} = 1.03, SD = 1.17$ )

**ตารางที่ 44** ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายชื่อ (N = 402)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.50	0.71	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.31	0.86	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	4.16	1.06	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง			
ครอบครัว สังคม	4.15	0.98	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่โก้ เก๋ ทันสมัย	4.08	1.00	มาก
สังคมไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	4.02	1.02	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.99	1.01	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.79	1.11	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียอทธิพลต่อข้าพเจ้า	3.76	1.08	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพยาเสพติด	3.69	0.92	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.52	1.06	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.51	1.02	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.51	1.29	มาก

จากตารางที่ 44 พบว่าด้านทัศนคติต่อสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก คือ การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X} = 4.50, SD = 0.71$ ) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.31, SD = 0.86$ ) และข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 4.16, SD = 1.06$ )

## 2.4 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น

ตารางที่ 45 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 149)

	ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
	ชาย	103	69.10
	หญิง	46	30.90
อายุ (ปี) ( $\bar{X} = 28.61$ , min = 14, max = 57)			
	12 – 20	28	19.10
	21 - 40	103	70.00
	41 – 60	16	10.90
ศาสนา			
	พุทธ	147	98.70
	อิสลาม	2	1.30
สถานภาพ			
	โสด	84	56.40
	สมรส	43	28.90
	หย่าร้าง	8	5.40
	แยกกันอยู่	12	8.10
	หม้าย	2	1.30
การศึกษาสูงสุด			
	ไม่ได้เรียนหนังสือ	2	1.30
	ประถมศึกษา	67	45.00
	ประถมศึกษา / ปวช.	74	49.70
	อนุปริญญา / ปวส.	6	4.10

## ตารางที่ 45 (ต่อ)

	ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพปัจจุบัน			
	รับจ้างทั่วไป	54	36.20
	ว่างงาน	27	18.10
	เกษตรกรรวม	22	14.80
	ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย	20	13.40
	นักเรียน / นักศึกษา	11	7.40
	คาราโอเกะ	6	4.00
	แม่บ้าน	5	3.40
	มอเตอร์ไซด์รับจ้าง	3	2.00
	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	0.70
รายได้ (บาท/เดือน)			
	ไม่มีรายได้	35	23.50
	1 – 3,000 บาท	29	19.50
	3,001 – 6,000	41	27.50
	6,001 – 10,000	26	17.40
	10,001 – 15,000	11	7.40
	มากกว่า 15,000	7	4.70
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัดรักษา			
	ฟันผุ	26	17.40
	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	13	8.70
	กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	13	8.70
	ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	13	8.70
	โรคผิวหนัง	12	8.10
	โลหิตจาง	4	2.70
	โรคหัวใจ ความดัน	3	2.00
	วัณโรค	1	0.70
	โรคตับ	1	0.70

## ตารางที่ 45 (ต่อ)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ปัญหาสุขภาพระหว่างการบำบัด</b>		
พินสุ	23	15.40
ปวดข้อ กล้ามเนื้อกระดูก	22	14.80
โรคผิวหนัง	11	7.40
กระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ	9	6.00
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	5	3.50
โลหิตจาง	3	2.00
โรคหัวใจ	2	1.30
ไมเกรน	1	0.70
<b>อาการทางจิต</b>		
inorganic insomnia	9	6.00
anxiety disorder	4	2.70
Depressive disorder	4	2.70
Adjustment disorder	3	2.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 45 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 28.61 ปี เพศชาย ร้อยละ 69.10 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.70 สถานภาพโสด ร้อยละ 56.40 สมรส ร้อยละ 28.90 การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 49.70 ประถมศึกษา ร้อยละ 45.00 อาชีพปัจจุบันส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.20 วางงาน ร้อยละ 18.10 รายได้เฉลี่ย 3,001-6,000 บาทต่อเดือน ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัดรักษา พบพินสุ ร้อยละ 17.40 ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัด พินสุ ร้อยละ 15.40 ปวดข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 14.80 มีอาการทางจิตที่พบจากการใช้ยาเสพติด inorganic insomnia ร้อยละ 6.00



ตารางที่ 46 จำนวน และร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มตัวอย่าง (N = 149)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
สุรา	57	38.30
บุหรี่	51	34.20
ยาแก้ไอ	21	14.10
ยาบ้า	12	8.10
ยานอนหลับ	7	4.70
กัญชา	5	3.40
ขาดความอ้วน	5	3.40
กระท่อม	1	0.70
โคเคน	1	0.70
เฮโรอีน	1	0.70
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
บุหรี่	88	59.10
สุรา	85	57.00
ยาบ้า	73	49.00
กัญชา	48	32.20
ยาไอซ์	20	13.40
กระท่อม	16	10.70
สารระเหย	14	9.40
ยาแก้ไอ	13	8.70
ขาดความอ้วน	11	7.40
ยาอี	10	6.70
เฮโรอีน	7	4.70
ยานอนหลับ	7	4.70
ยาเค	4	2.70

ตารางที่ 46 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	123	82.60
บุหรี่	120	80.50
สุรา	111	74.50
กัญชา	56	37.60
ยาแก้ไอ	30	20.10
ยาไอซ์	20	13.40
สารระเหย	16	10.70
ยานอนหลับ	15	10.10
กระท่อม	13	8.70
ยาลดความอ้วน	10	6.70
ยาอี	6	4.00
โคเคน	3	2.00
ยาเค	2	1.30

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 46 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ดื่มสุรา ร้อยละ 38.30 สูบบุหรี่ ร้อยละ 34.20 และใช้ยาแก้ไอ ร้อยละ 14.10 เมื่อจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า สูบบุหรี่ ร้อยละ 59.10 ดื่มสุรา ร้อยละ 57.00 เสพยาบ้า ร้อยละ 49.00 และเมื่อจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เสพยาบ้า ร้อยละ 82.60 สูบบุหรี่ ร้อยละ 80.50 และดื่มสุรา ร้อยละ 74.50

ตารางที่ 47 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด(N=149)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก ปี ( $\bar{X} = 19.21$ , $SD = 5.99$ , min = 10, max = 46)		
7 – 20	107	73.30
21 – 40	36	24.80
41 – 60	3	2.10
สาเหตุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	87	58.40
เพื่อนชวน	34	22.80
ช่วยอาชีพ	10	6.70
เครียด / ไม่สบายใจ	10	6.70
เพื่อความสนุกสนาน	7	4.70
เพิ่มความมั่นใจ	1	0.70
สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	97	66.00
กัญชา	39	26.50
สารระเหย	5	3.40
ยาไอซ์	3	2.00
โคเคน	2	1.40
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้เสพ	78	52.30
ผู้ติด	56	37.60
เสพยาติดรุนแรง	15	10.10
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	95	64.60
ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน	25	17.00
ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	18	12.20
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	9	6.10

## ตารางที่ 47 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
วิธีการเสพ		
สูบ	137	91.90
กิน	6	4.00
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	6	4.00
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติด		
เพื่อความสนุกสนาน	57	38.50
เพื่อลดความเครียดหรือกังวลใจ	33	22.30
เพื่อนงานอาชีพ	33	22.30
ติดใจในรสชาติ / ฤทธิ์ยา	13	8.80
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	5	3.40
เพื่อการเข้าสังคม	4	2.70
ไม่เคยคิดจะเลิก	2	1.40
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	1	0.70
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	114	77.00
มีผู้มาจำหน่ายถึงที่	64	43.20
แฟน / สามี / ภรรยา	12	8.10
จากสถานบันเทิง	5	3.40
จากร้านค้า	3	2.00
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท/วัน)		
200 -300	38	25.70
> 500	35	23.60
300 - 500	29	19.60
1 - 50	23	15.50
101 - 200	14	9.50
51 - 100	9	6.10

## ตารางที่ 47 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลใกล้ชิด		
ไม่ทราบ	79	53.40
ทราบ	69	46.60
การบำบัดรักษา		
ไม่เคย	115	77.70
เคย	33	22.30
ระยะเวลาบำบัดอยู่นาน		
1 เดือน	65	45.50
4 เดือน	36	25.20
2 เดือน	22	15.40
3 เดือน	20	14.00
*คดีที่ถูกจับกุม		
ยาบ้า	123	83.70
กัญชา	29	19.70
เฮโรอีน	3	2.00
สารระเหย	1	0.70

\*ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 47 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 19.21 ปี (SD = 5.99) อายุต่ำสุด 10 ปี สาเหตุสำคัญที่สารเสพติดครั้งแรก คือ อยากรอง ร้อยละ 58.40 เพื่อนชวน ร้อยละ 22.80 ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือ ยาบ้า ร้อยละ 66.00 กัญชา ร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 52.30 ซึ่งลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบันใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 64.60 เสพโดยวิธีการสูบ ร้อยละ 91.90 สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดเพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 38.50 เพื่อลดความเครียดหรือกังวลใจ และเพื่องานอาชีพ ร้อยละ 22.30 แหล่งซื้อสารเสพติดส่วนใหญ่จากเพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน ร้อยละ 77.00 และมีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่ ร้อยละ 43.20 ค่าใช้จ่ายในการเสพยาเฉลี่ย 200-300 บาทต่อวัน

บุคคลใกล้ชิดทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเสพยาเสพติด ร้อยละ 53.40 ส่วนใหญ่ไม่เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 77.70 ระยะเวลาในการบำบัดขณะตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รักษาได้นาน 1 เดือน ร้อยละ 45.50 และอยู่นาน 4 เดือน ร้อยละ 25.20 คดีที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นยาบ้า ร้อยละ 83.70

**ตารางที่ 48 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว (N = 149)**

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สภาพการครองเรือน บิดา-มารดา		
อยู่ด้วยกัน	65	43.60
บิดาถึงแก่กรรม	31	20.80
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	29	19.50
มารดาถึงแก่กรรม	14	9.40
บิดามารดาถึงแก่กรรม	10	6.70
กรณีที่บิดา-มารดาแยกกันอยู่		
มารดามีสามีใหม่	9	31.80
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	8	29.50
บิดามีภรรยาใหม่	8	29.50
บิดาและมารดาแยกกันอยู่โดยไม่มีครอบครัวใหม่	3	9.10
*ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
สามี/ภรรยา	43	28.90
บิดามารดา	40	26.80
มารดา	29	19.50
ญาติ	22	14.80
คนเดียว	14	9.40
เพื่อนสนิท/แฟน	6	4.00
บิดา	4	2.70

## ตารางที่ 48 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักบิดา		
เกษตรกรรม	51	37.50
รับจ้างทั่วไป	42	30.90
ว่างงาน	18	13.20
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	14	10.30
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	11	8.10
อาชีพหลักของมารดา		
เกษตรกรรม	50	35.70
รับจ้างทั่วไป	34	24.30
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	24	17.10
ว่างงาน	19	12.80
แม่บ้าน	8	5.70
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	5	3.60
รายได้ของบิดามารดา		
< 5,000	64	46.40
5,001 – 10,000	42	30.40
10,001 – 15,000	17	12.30
15,001 – 20,000	10	7.20
> 20,000	5	3.60
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{X}$ =3.51, SD = 2.24, min =1, max = 11)		
ลูกคนเดียว	16	10.80
2	41	27.70
3	43	29.10
4	16	10.80
5 คนขึ้นไป	32	21.80

## ตารางที่ 48 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ลำดับพี่น้อง ( $\bar{X}=2.53, SD=2.07, \min=1, \max=11$ )		
1	59	39.90
2	40	27.00
3	19	12.80
4	11	7.40
5 คนขึ้นไป	19	12.80
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	84	56.80
ผู้อาศัย	34	23.00
หัวหน้าครอบครัว	27	18.20
พี่น้อง	3	2.00
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	53	36.10
สามี/ภรรยา	30	20.40
ญาติที่เลี้ยงดู (ปู่ ย่า ตา ยาย)	29	19.70
พี่น้อง	19	12.90
บิดา	16	10.90
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	93	63.70
ทะเลาะกันบางครั้ง	42	28.80
ไม่ค่อยได้พบกัน	8	5.50
ทะเลาะกันเป็นประจำ	3	2.10
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	97	67.40
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	19	13.20
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	16	11.10
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	12	8.30



## ตารางที่ 48 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
มารดา	37	25.30
บิดามารดา	35	24.00
พี่ / น้อง	28	19.20
สามี / ภรรยา	25	17.10
ญาติ	12	8.20
บิดา	9	6.20

จากตารางที่ 48 จำแนกและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำแนกตามสภาพแวดล้อม และลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 43.60 บิดาถึงแก่กรรม ร้อยละ 20.80 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 19.50 ในกรณีที่บิดาแยกกันอยู่ มารดามีสามีใหม่ ร้อยละ 31.80 ที่พักอาศัยในปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา ร้อยละ 28.90 บิดามารดา ร้อยละ 26.80 บิดามีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 37.50 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.90 มารดามีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 35.70 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.30 รายได้เฉลี่ย < 5,000 บาทต่อเดือน มีจำนวนพี่น้อง 3 คน ร้อยละ 29.10 และ จำนวน 2 คน ร้อยละ 27.70 สถานภาพในครอบครัว เป็นสมาชิก ร้อยละ 56.80 บุคคลที่ไว้วางใจส่วนใหญ่ คือมารดา ร้อยละ 36.10 สามีหรือภรรยา ร้อยละ 20.40 ความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 63.70 การเลี้ยงดูของครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ร้อยละ 67.40 การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่จากมารดา ร้อยละ 25.30 บิดามารดา ร้อยละ 24.00

ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.66	0.52	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.55	0.76	มาก
สภาพแวดล้อมชุมชน	3.50	0.52	มาก
ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ	2.51	0.36	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.78	0.51	มาก

จากตารางที่ 49 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.51, SD = 0.36$ ) และในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.78, SD = 0.51$ ) ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ( $\bar{X} = 3.66, SD = 0.52$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.55, SD = 0.76$ ) สภาพแวดล้อมด้านชุมชน ( $\bar{X} = 3.50, SD = 0.50$ )

ตารางที่ 50 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ (N=149)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย	4.69	.75	มาก
มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว	4.54	.90	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	3.99	1.08	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	3.97	1.04	มาก
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลัวกับปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด	3.79	1.12	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในตัวท่าน	3.61	.95	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	3.52	1.08	มาก
เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคคนในครอบครัว	3.50	1.23	มาก

ตารางที่ 50 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.48	1.11	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ภายในครอบครัว	3.14	1.11	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวเรื่องสุขภาพของท่าน	2.99	1.30	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัว เมื่อมีเวลาว่าง	2.86	1.29	มาก

จากตารางที่ 50 ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.69$ ,  $SD = 0.75$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.45$ ,  $SD = 0.90$ ) และบุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา ( $\bar{X} = 3.99$ ,  $SD = 1.08$ )

ตารางที่ 51 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมเพื่อน จำแนกเป็นรายชื่อ (N=149)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อน ที่ใช้สารเสพติด	4.01	1.14	มาก
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก	3.94	1.10	มาก
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	3.92	1.03	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.91	1.19	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.86	1.19	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด	3.78	1.11	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.00	1.07	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.54	1.23	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	3.32	1.28	มาก

ตารางที่ 51 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเลิกเสพยาเสพติด	3.18	1.18	มาก
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	3.02	1.23	มาก
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.68	1.15	มาก

จากตารางที่ 51 ด้านการปฏิบัติสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษาในกลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 4.01$ ,  $SD = 1.14$ ) รองลงมา คือ เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X} = 3.94$ ,  $SD = 1.10$ ) และท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 3.92$ ,  $SD = 1.03$ )

ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมเพื่อน จำแนกเป็นรายข้อ (N=149)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน		
ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	104	70.70
ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่	66	44.60
ท่านเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกรจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่	62	41.90
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด	47	31.80

จากตารางที่ 52 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ร้อยละ 70.70 ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 44.60 กลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกรจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 41.90 และมีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 31.80

ตารางที่ 53 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N= 149)

ข้อความ	$\bar{X}$	ระดับ ความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยา เสพติดอย่างจริงจัง	3.95 1.23	มาก
ท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด	3.90 1.06	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติด ที่หาซื้อได้ง่าย	3.82 1.06	มาก
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	3.79 1.21	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อน เสพยาเสพติด	3.62 1.20	มาก
คนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงาน) ไม่ยอมรับท่าน เพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.50 1.195	มาก
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	3.42 1.11	มาก
ท่านรู้สึกว่าคนในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	3.30 1.24	มาก
ตั้งแต่เสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	3.15 1.10	มาก
	2.65 1.57	มาก

จากตารางที่ 53 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” ทุกข้อใน  
ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนใน  
ละแวกบ้านเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X} = 3.95$ ,  $SD = 1.23$ ) รองลงมา คือ ที่ทำงาน โรงเรียนหรือชุมชน  
ของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X} = 3.90$ ,  $SD = 1.06$ ) และท่านมักไปในสถานที่  
มั่วสุมยาเสพติด ( $\bar{X} = 3.82$ ,  $SD = 1.06$ )

ตารางที่ 54 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ  
จำแนกเป็นรายข้อ (N= 149)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติด เราไม่สามารถควบคุมมันได้ ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	3.26	1.023	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	3.22	0.96	มาก
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.07	1.12	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.87	1.25	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ด้านจิตใจ	2.75	1.02	มาก
เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.47	1.03	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ในชุมชน	2.21	1.01	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.19	1.13	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.05	1.096	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่ต้องเข้า สถานบำบัด	1.03	1.03	ปานกลาง

จากตารางที่ 54 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” จำนวน 5 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 3.26$ ,  $SD = 1.02$ ) รองลงมา คือ ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 3.22$ ,  $SD = 0.96$ ) และท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.07$ ,  $SD = 1.12$ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” จำนวน 5 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เข้มแข็งขึ้น ( $\bar{X} = 2.21$ ,  $SD = 1.01$ ) และการใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา ( $\bar{x} = 2.19$ ,  $SD = 1.13$ )

ตารางที่ 55 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด  
จำแนกเป็นรายข้อ (N = 149)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.44	0.64	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.21	0.82	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	4.11	1.10	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่โก้ เก๋ ทันสมัย	4.04	0.93	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง			
ครอบครัว สังคม	4.03	0.97	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.94	0.97	มาก
สังคม ไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	3.91	1.00	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียอทธิพลต่อข้าพเจ้า	3.73	1.09	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.71	1.11	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.63	1.62	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.62	0.97	มาก
การเสพยาเสพติดช่วยแก้แอกการเงินอายุได้	3.42	1.14	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.42	1.13	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.92	1.18	มาก

จากตารางที่ 55 ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย 3 อันดับแรก คือ การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X} = 4.44$ , SD = 0.64) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.21$ , SD = 0.82) และข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 4.11$ , SD = 1.10)

## 2.5 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปิดตานิ

ตารางที่ 56 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 50)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	50	100.00
อายุ (ปี) ( $\bar{X} = 26.86, \min = 17, \max = 50$ )		
12 -20	11	22.00
21 – 40	34	68.00
41 – 60	5	10.00
ศาสนา		
พุทธ	11	22.00
อิสลาม	39	78.00
สถานภาพ		
โสด	35	70.00
สมรส	10	20.00
หย่าร้าง	1	2.00
แยกกันอยู่	4	8.00
การศึกษาสูงสุด		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	5	10.00
ประถมศึกษา	30	60.00
มัธยมศึกษา/ปวช.	15	30.00
อาชีพปัจจุบัน		
รับจ้างทั่วไป	32	64.00
ว่างงาน	7	14.00
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	7	14.00
เกษตรกรกรรม	2	4.00
นักเรียน/นักศึกษา	2	4.00



## ตารางที่ 56 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน (บาท)		
ไม่มีรายได้	6	12.00
1 - 3,000	10	20.00
3,001 – 6,000	24	48.00
6,001 – 10,000	9	18.00
> 15,000	1	2.00
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัด		
ฟันผุ	15	30.00
โรคผิวหนัง	8	16.00
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	6	12.00
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	3	6.00
โรคหัวใจ ความดัน	3	6.00
ไมเกรน	3	6.00
โรคลมชัก	2	4.00
วัณโรค	1	2.00
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	1	2.00
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	1	2.00
*ปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัดรักษา		
ฟันผุ	16	32.00
โรคผิวหนัง	10	20.00
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	8	16.00
โรคหัวใจ	3	6.00
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	2	4.00
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	1	2.00
วัณโรค	1	2.00
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	1	2.00
ไมเกรน	1	2.00

ตารางที่ 56 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
*อาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด		
Inorganic insomnia	2	4
anxiety disorder	2	4
Depressive disorder	1	2

จากตารางที่ 56 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.00 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 26.86 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 78.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 70.00 สมรส ร้อยละ 20.00 การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.00 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 30.00 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 10.00 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 64.00 ว่างานและธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ร้อยละ 14.00 มีระดับรายได้เฉลี่ย 3,001- 6,000 บาทต่อเดือน

ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัดรักษา พบว่า มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 30.00 โรคผิวหนัง ร้อยละ 16.00 ปวดข้อกล้ามเนื้อหรือกระดูก ร้อยละ 12.00 และปัญหาสุขภาพในระหว่างการบำบัดรักษา พบว่า มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 32.00 โรคผิวหนัง ร้อยละ 20.00 ปวดข้อกล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 16.00 ส่วนอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด Inorganic insomnia, anxiety disorder ร้อยละ 4.0 และ Depressive disorder ร้อยละ 2.0

ตารางที่ 57 จำนวนและร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มตัวอย่าง (N = 50)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว		
บุหรี	9	18.00
สุรา	3	6.10
ยาแก้ไอ	2	4.00
ยาบ้า	1	2.00
กัญชา	1	2.00
ยานอนหลับ	1	2.00
กระท่อม	1	2.00
ยาลดความอ้วน	1	2.00

## ตารางที่ 57 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
ยาบ้า	27	54.00
กัญชา	19	38.00
กระท่อม	18	36.00
บุหรี	17	34.00
สุรา	16	32.00
ยาแก้ไอ	12	24.00
ยาไอซ์	9	18.00
เฮโรอีน	8	16.00
ยาอี	5	10.00
สารระเหย	4	8.00
ยานอนหลับ	4	8.00
ยาเค	2	4.00
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	40	80.00
กัญชา	33	66.00
บุหรี	33	66.00
ยาแก้ไอ	25	50.00
กระท่อม	21	42.00
สุรา	19	38.00
ยาไอซ์	10	20.00
เฮโรอีน	8	16.00
ยานอนหลับ	7	14.00
ยาอี	6	12.00
ยาเค	2	4.00
สารระเหย	1	2.00
ยาลดความอ้วน	1	2.00

\* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 57 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.00 ดื่มสุรา ร้อยละ 6.10 ยาแก้ไอ ร้อยละ 4.00 จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า เพื่อนสนิทของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 54.00 กัญชา ร้อยละ 38.00 กระท่อม ร้อยละ 36.00 จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ยาบ้าร้อยละ 80.00 กัญชาและบุหรี่ ร้อยละ 66.00

ตารางที่ 58 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด(N=50)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X} = 18.28$ , $SD = 4.95$ , $\min = 12$ , $\max = 38$ )		
7 – 20	44	88.00
21 – 40	6	12.00
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	29	58.00
เพื่อนชวน	11	22.00
เพื่อความสนุกสนาน	4	8.00
เครียด/ไม่สบายใจ	3	6.00
ช่วยอาชีพ	3	6.00
ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
กัญชา	26	55.30
ยาบ้า	15	31.90
ยาแก้ไอ	3	6.40
เฮโรอีน	1	2.10
ยาไอซ์	1	2.10
กระท่อม	1	2.10
ประเภทผู้ป่วย		
ผู้เสพ	33	66.00
ผู้ติด	14	28.00
เสพติดรุนแรง	3	6.00

## ตารางที่ 58 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	22	44.00
ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	15	30.00
ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน	12	24.00
ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	1	2.00
วิธีการเสพ		
สูบ	37	74.00
กิน	6	12.00
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	4	8.00
ฉีด	3	6.00
สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ	15	30.00
เพื่อความสนุกสนาน	10	20.00
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	7	14.00
เพื่อการเข้าสังคม	7	14.00
เพื่องานอาชีพ	6	12.00
จิตใจในรสชาติ / ฤทธิ์ยา	3	6.00
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	2	4.00
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	38	76.00
มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่	11	22.00
จากร้านค้า	5	10.00
จากสถานบันเทิง	4	8.00

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

## ตารางที่ 58 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา		
200 – 300	20	40.00
300 – 500	13	26.00
1 – 50	6	12.00
101 – 200	4	8.00
> 500	4	8.00
51 - 100	3	6.00
บุคคลใกล้ชิด		
ทราบ	37	74.00
ไม่ทราบ	12	24.00
ไม่แน่ใจ	1	2.00
การบำบัดรักษา		
ไม่เคยบำบัด	37	75.50
เคยบำบัด	12	24.50
ระยะเวลาขณะบำบัด		
1 เดือน	32	65.30
4 เดือน	13	26.50
2 เดือน	3	6.10
3 เดือน	1	2.00
*คดีที่ถูกจับกุม		
ยาบ้า	35	71.40
กัญชา	17	34.70
กระท่อม	8	16.30
เฮโรอีน	4	8.20

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 58 พบว่า จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษานี้จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุระหว่าง 7-20 ปี

อายุเฉลี่ย 18.28 ปี (SD =4.95) อายุต่ำสุด 12 ปี สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ อายากล่อง ร้อยละ 58.00 เพื่อนชวน ร้อยละ 22.00 และเพื่อความสนุกสนานร้อยละ 8.00 ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก กัญชา ร้อยละ 55.30 ยาบ้า ร้อยละ 31.90 ยาแก้ไอ ร้อยละ 6.40 ประเภทของผู้ป่วยเป็นผู้เสพ ร้อยละ 66.00 ผู้ติด 28.00 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 44.0 ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์ ร้อยละ 30.00 ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน ร้อยละ 24.00

**ตารางที่ 59 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อม และลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว (N = 50)**

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพการครองเรือน บิดา- มารดา		
อยู่ด้วยกัน	24	48.00
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	10	20.00
บิดาถึงแก่กรรม	10	20.00
บิดามารดาถึงแก่กรรม	5	10.00
มารดาถึงแก่กรรม	1	2.00
กรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่		
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	3	30.00
มารดามีสามีใหม่	3	30.00
บิดามีภรรยาใหม่	3	30.00
แยกกันอยู่โดยไม่ได้มีครอบครัวใหม่	1	10.00
*ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
บิดามารดา	20	40.00
สามี / ภรรยา	8	16.00
มารดา	7	14.00
ญาติ	7	14.00
บิดา	4	8.00
คนเดียว	2	4.00
แฟน / เพื่อนสนิท	2	4.00

\* ตอบได้มากกว่า 1ข้อ

ตารางที่ 59 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพหลักบิดา		
รับจ้างทั่วไป	25	61.00
เกษตรกรกรรม	12	14.60
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	6	14.60
ว่างงาน	2	4.90
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	4.90
อาชีพหลักมารดา		
รับจ้างทั่วไป	17	36.96
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	15	32.61
ว่างงาน	7	15.22
เกษตรกรกรรม	5	10.87
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	4.35
รายได้ของบิดามารดา (บาท/เดือน)		
ต่ำกว่า 5,000	19	42.20
5,001 – 10,000	19	42.20
10,001 – 15,000	6	13.30
15,001 – 20,000	1	2.20
จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน ( $\bar{X} = 4.42$ , $SD = 2.62$ , $min = 1$ , $max = 11$ )		
คนเดียว	4	8.00
2 คน	8	16.00
3 คน	13	26.00
4 คน	4	8.00
5 คนขึ้นไป	21	42.00



ตารางที่ 59 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ลำดับพี่น้องในครอบครัว ( $\bar{X} = 2.44$ , $SD = 1.70$ , $\min = 1$ , $\max = 10$ )		
1	19	38.00
2	10	20.00
3	11	22.00
4	6	12.00
5 คนขึ้นไป	4	8.00
จำนวนสมาชิกในครอบครัว ( $\bar{X} = 5.63$ , $SD = 2.29$ , $\min = 2$ , $\max = 12$ )		
1 – 5 คน	24	49.00
6 – 10 คน	24	49.00
11 คนขึ้นไป	1	2.00
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	29	59.20
ผู้อาศัย	12	24.50
หัวหน้าครอบครัว	8	16.30
บุคคลในครอบครัวที่ไว้ใจ		
มารดา	17	34.70
สามี/ภรรยา	10	20.20
พี่น้อง	8	16.30
ญาติ	8	16.30
บิดา	6	12.20
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	23	47.90
ทะเลาะกันบางครั้ง	19	39.60
ทะเลาะกันเป็นประจำ	6	12.50

## ตารางที่ 59 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
การเลี้ยงดูของครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	35	71.40
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	10	20.40
เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขัน	3	6.10
เลี้ยงดูอย่างตามใจ	1	2.00
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
บิดามารดา	14	28.00
มารดา	10	20.00
พี่/น้อง	9	18.00
สามี/ภรรยา	7	14.00
ญาติ	7	14.00
บิดา	3	6.00

จากตารางที่ 59 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาด้านสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดามารดาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 48.00 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่และบิดาถึงแก่กรรม ร้อยละ 20.00 ในกรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่ บิดามารดามีครอบครัวใหม่ มารดามีสามีใหม่และบิดา มีภรรยาใหม่ ร้อยละ 31.30 ที่พักอาศัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่พักอาศัยกับบิดามารดา ร้อยละ 40.00 อยู่กับสามีหรือภรรยา ร้อยละ 16.00 อาชีพหลักของบิดาส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 61.00 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 14.60 อาชีพหลักมารดาจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.96 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.61 วางงานร้อยละ 15.22 รายได้ของบิดามารดาเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกันมี 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 42.00 3 คน ร้อยละ 26.00 และ 2 คน ร้อยละ 16.00 ลำดับพี่น้องในครอบครัวเป็นลูกคนแรก ร้อยละ 38.00 คนที่ 3 ร้อยละ 22.00 คนที่ 2 ร้อยละ 20.00 จำนวนสมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 1-5 คน และ 6-10 คน ร้อยละ 49.00 เฉลี่ย 5.63 คน (SD = 2.29) สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ร้อยละ 59.20 ผู้อาศัยร้อยละ 24.50 หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 16.30 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 47.90 ทะเลาะกันบางครั้ง ร้อยละ 39.60 ทะเลาะ

กันเป็นประจำ ร้อยละ 12.50 การเลี้ยงดูของครอบครัวส่วนใหญ่เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล ร้อยละ 71.40 เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง ร้อยละ 20.40

**ตารางที่ 60 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน**

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.47	0.50	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.07	0.72	มาก
สภาพแวดล้อม ชุมชน	3.00	0.50	มาก
ด้านความเชื่อ / จิตวิญญาณ	2.29	0.43	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.43	0.58	มาก

จากตารางที่ 60 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.29$ ,  $SD = 0.43$ ) และระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ( $\bar{X} = 3.47$ ,  $SD = 0.50$ ) ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.43$ ,  $SD = 0.58$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.07$ ,  $SD = 0.72$ ) สภาพแวดล้อมด้านชุมชน ( $\bar{X} = 3.00$ ,  $SD = 0.50$ )

**ตารางที่ 61 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ (N= 50)**

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	4.48	0.97	มาก
มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว	4.45	0.94	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย	4.37	0.95	มาก
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลุ่มใจกับปัญหา			
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด	3.72	1.11	มาก

ตารางที่ 61 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	3.65	0.95	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.50	1.06	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจในตัวท่าน	3.33	1.01	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	3.20	0.93	มาก
เมื่อท่านมีปัญหาท่านปรึกษาคนในครอบครัว	3.20	1.26	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวใจเรื่องสุขภาพของท่าน	2.92	1.26	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัว	2.84	1.00	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	2.62	1.18	ปานกลาง

จากตารางที่ 61 พบว่า ด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง ( $\bar{X} = 2.62$ ,  $SD = 1.18$ ) ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านดีมีสุรา ( $\bar{X} = 4.48$ ,  $SD = 0.97$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.45$ ,  $SD = 0.94$ ) และบุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.37$ ,  $SD = 0.95$ )

ตารางที่ 62 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อน  
จำแนกเป็นรายชื่อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก	3.53	1.08	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อน ที่ใช้สารเสพติด	3.37	1.24	มาก
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	3.35	1.21	มาก
ท่านปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด	3.33	1.14	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.30	1.06	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.22	1.11	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.22	1.20	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.10	1.21	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	2.92	1.09	มาก
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเสพยาเสพติด	2.76	1.33	มาก
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.58	1.07	ปานกลาง
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	2.56	0.88	ปานกลาง

จากตารางที่ 62 พบว่า การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 2 ข้อ คือ กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 2.58$ ,  $SD = 1.07$ ) และเพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 2.56$ ,  $SD = 0.88$ ) ส่วนข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X} = 3.53$ ,  $SD = 1.08$ ) รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจใช้ท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 3.37$ ,  $SD = 1.24$ ) และท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 3.35$ ,  $SD = 1.21$ )

ตารางที่ 63 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N=50)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน		
ในชุมชนของท่านมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด	30	61.20
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด	27	55.10
ในชุมชนของท่านมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	19	38.80
ท่านเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด	18	36.70

จากตารางที่ 63 พบว่า สภาพแวดล้อมด้านชุมชนของกลุ่มตัวอย่างมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 61.20 สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 55.10 ในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด ร้อยละ 38.80 และกลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 36.70

ตารางที่ 64 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงานไม่ได้) โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติด	3.42	1.31	มาก
อย่างจริงจัง	3.34	1.17	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติด	3.18	1.10	มาก
ที่หาซื้อได้ง่าย	3.18	1.29	มาก
คนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงาน) ไม่ยอมรับท่าน	3.14	0.99	มาก
เพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.06	1.07	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	2.94	1.17	มาก
ท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด			
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย			

ตารางที่ 64 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความเป็นจริง
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	2.84	1.25	มาก
ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	2.60	1.46	ปานกลาง
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	2.57	1.23	ปานกลาง

จากตารางที่ 64 ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” จำนวน 2 ข้อ คือ ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน ( $\bar{X}= 2.60$ ,  $SD = 1.46$ ) และชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X} = 3.42$ ,  $SD = 1.31$ ) รองลงมา คือ โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X} = 3.34$ ,  $SD = 1.17$ ) และบริเวณที่ทำงานโรงเรียนบ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติดที่หาซื้อได้ง่าย ( $\bar{X} = 3.18$ ,  $SD = 1.10$ )

ตารางที่ 65 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.00	1.14	มาก
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ	2.76	1.14	มาก
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	2.63	1.32	ปานกลาง
ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	2.35	1.27	ปานกลาง
เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.30	1.06	ปานกลาง

ตารางที่ 65 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.26	1.37	ปานกลาง
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน	2.12	.98	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	1.94	1.36	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้า สถานบำบัด	1.90	1.11	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	1.82	0.97	ปานกลาง

จากตารางที่ 65 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณกลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” จำนวน 2 ข้อ คือ ท่านเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.00$ ,  $SD = 1.14$ ) และท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ( $\bar{X} = 2.76$ ,  $SD = 1.14$ ) กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 2.63$ ,  $SD = 1.32$ ) รองลงมา คือ ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 2.35$ ,  $SD = 1.27$ ) และเมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น

ตารางที่ 66 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายข้อ (N = 50)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.24	0.82	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.14	0.95	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง			
ครอบครัว สังคม	4.04	1.07	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	3.90	0.95	มาก



ตารางที่ 66 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความคิดเห็น
สังคม ไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	3.88	1.09	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพยาเสพติด	3.54	1.05	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.54	1.23	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.51	1.19	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.44	1.07	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่โก้ เก๋ ทันสมัย	3.42	1.28	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	2.96	1.40	มาก
การเสพยาเสพติดแก้อาการเงินอายุได้	2.90	1.23	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	2.90	1.23	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียาพิษพลต่อข้าพเจ้า	2.88	1.15	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.57	1.14	ปานกลาง

จากตารางที่ 66 พบว่า ด้านทัศนคติต่อสารเสพติดกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้ ( $\bar{X} = 2.57$ ,  $SD = 1.14$ ) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม ( $\bar{X} = 4.24$ ,  $SD = 0.82$ ) รองลงมา คือ การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.14$ ,  $SD = 0.95$ ) และการเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ( $\bar{X} = 4.04$ ,  $SD = 1.07$ )

## 2.6 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

ตารางที่ 67 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 50)

ข้อมูลส่วนบุคคล		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	130	81.30
	หญิง	30	18.80
อายุ (ปี) ( $\bar{X} = 26.35$ , min = 12, max = 57)			
	12 - 20	42	26.50
	21 - 40	105	66.50
	41 - 60	11	6.80
ศาสนา	พุทธ	111	69.40
	อิสลาม	48	30.00
	คริสต์	1	0.60
สถานภาพ	โสด	91	56.90
	สมรส	49	30.60
	หย่าร้าง	9	5.60
	แยกกันอยู่	7	4.40
	หม้าย	4	2.50
ระดับการศึกษา	ไม่ได้เรียนหนังสือ	6	3.80
	ประถมศึกษา	85	53.10
	มัธยมศึกษา / ปวช.	61	38.10
	อนุปริญญา / ปวส.	6	3.80
	ปริญญาตรี	2	1.30
อาชีพปัจจุบัน	รับจ้างทั่วไป	66	41.30
	ว่างงาน	27	16.90
	เกษตรกรกรรม	23	14.40
	ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย	23	14.40
	นักเรียน/นักศึกษา	9	5.60

ตารางที่ 67 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
คาราโอเกะ	7	4.40
แม่บ้าน	5	3.10
รายได้ต่อเดือน/บาท		
ไม่มีรายได้	35	21.90
1 – 3,000	29	18.10
3,001 – 6,000	51	31.90
6,001 – 10,000	28	17.50
10,001 – 15,000	9	5.60
มากกว่า 15,000	8	5.00
*ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัดรักษา		
ฟันผุ	32	20.00
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	25	15.60
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	22	13.80
โรคผิวหนัง	12	7.50
กระเพาะหรือลำไส้อักเสบ	8	5.00
ไมเกรน	6	3.80
อื่นๆ	5	3.10
โลหิตจาง	3	1.90
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	2	1.30
เบาหวาน	2	1.30
โรคลมชัก	2	1.30
โรคหัวใจ ความดัน	2	1.30
โรคตับ	1	0.60

## ตารางที่ 67 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ปัญหาสุขภาพระหว่างการบำบัดรักษา</b>		
ฟันผุ	31	19.40
ปวดข้อ กล้ามเนื้อหรือกระดูก	30	18.80
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	18	11.30
โรคผิวหนัง	15	9.40
ไมเกรน	6	3.80
อื่นๆ	5	3.10
กระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ	5	3.10
โรคหัวใจ	3	1.90
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	3	1.90
โลหิตจาง	2	1.30
เบาหวาน	1	0.60
โรคตับ	1	0.60
โรคลมชัก	1	0.60
<b>อาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด</b>		
Schizophrenia disorder	6	3.80

\*ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 67 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.50 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุเฉลี่ย 26.35 ปี ร้อยละ 81.30 เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 69.40 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 30.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.90 สมรส ร้อยละ 56.90 การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 38.10 อาชีพในปัจจุบันรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 41.30 ว่างาน ร้อยละ 16.90 รายได้เฉลี่ย 3,001-6,000 บาทต่อเดือน

ปัญหาสุขภาพก่อนการบำบัดรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 20.00 ปวดข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 15.60 ในระหว่างการบำบัดรักษามีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 19.40 ปวดข้อ กล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 18.80

อาการทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด พบ Schizophrenia disorder ร้อยละ 3.80

ตารางที่ 68 จำนวนและร้อยละจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มตัวอย่าง (N = 160)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว</b>		
บุหรี	45	28.10
สุรา	33	20.60
ยาบ้า	11	6.90
กัญชา	7	4.40
ขาดความอ้วน	5	3.10
กระท่อม	2	1.30
ยาแก้ไอ	2	1.30
ยาไอซ์	1	0.60
ยาอี	1	0.60
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท</b>		
บุหรี	78	48.80
สุรา	68	42.50
กัญชา	60	37.50
ยาไอซ์	31	19.40
ยาแก้ไอ	30	18.80
กระท่อม	27	16.90
สารระเหย	14	8.80
ยาอี	13	8.10
ยานอนหลับ	8	5.00
ยาเค	8	5.00
ขาดความอ้วน	3	1.90
โคเคน	2	1.30
ยาแก้ไอ	1	0.60

## ตารางที่ 68 (ต่อ)

ชนิดสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>*ประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง</b>		
ยาบ้า	112	70.00
บุหรี่	112	70.00
กัญชา	81	50.60
สุรา	67	41.90
กระท่อม	28	17.50
ยาแก้ไอ	25	15.60
ยานอนหลับ	10	6.30
สารระเหย	13	8.10
เฮโรอีน	12	7.50
ขาดความอ้วน	7	4.40
ยาอี	1	0.60
ยาไอซ์	1	0.60

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 68 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว พบว่า บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 28.10 ดื่มสุรา ร้อยละ 20.60 เมื่อจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของเพื่อนสนิท พบว่า เพื่อนสนิทของกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 48.80 ดื่มสุรา ร้อยละ 42.50 และจำแนกตามประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสพยาบ้า สูบบุหรี่ ร้อยละ 70.00 และสูบกัญชา ร้อยละ 50.60

ตารางที่ 69 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติด

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี) ( $\bar{X}$ =19.43, min = 10, max = 42)		
7 - 20	107	69.00
21 - 40	47	30.20
41 - 60	1	0.60
สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก		
อยากลอง	102	63.80
เพื่อนชวน	26	16.30
เพื่อความสนุกสนาน	15	9.40
เครียด/ไม่สบายใจ	9	5.60
ช่วยอาชีพ	5	3.10
เพิ่มความมั่นใจ	3	1.90
สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก		
ยาบ้า	76	49.40
กัญชา	65	42.20
สารระเหย	4	2.60
ยาไอซ์	2	1.30
ยาอี	2	1.30
กระท่อม	2	1.30
ยาแก้ไอ	2	1.30
มอร์ฟิน	1	0.60
ประเภทของผู้ป่วย		
ผู้เสพ	88	55.00
ผู้ติด	71	44.40
เสพยาครั้งรุนแรง	1	0.60

## ตารางที่ 69 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
-ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้	81	50.90
-ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน	44	27.70
-ใช้เป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์หรือทุกสัปดาห์	27	17.00
-ใช้เป็นประจำทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือน	7	4.40
วิธีการเสพ		
สูบ	146	92.40
ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม	7	4.40
กิน	4	2.50
ฉีด	1	0.60
สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบัน		
เพื่อความสนุกสนาน	55	34.40
เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลใจ	39	24.50
เพื่องานอาชีพ	21	13.20
คิดใจในรสนชาติ/ฤทธิ์ยา	21	13.20
คิดว่าไม่สามารถเลิกได้	11	6.90
เพื่อการเข้าสังคม	7	4.40
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	3	1.90
ไม่เคยคิดจะเลิก	2	1.20
*แหล่งซื้อสารเสพติด		
เพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน	127	79.90
มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่	43	27.00
จากสถานบันเทิง	18	11.30
แฟน/สามี/ภรรยา	7	4.40
จากร้านค้า	3	1.90



## ตารางที่ 69 (ต่อ)

ประวัติการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการเสพยา (บาท/วัน)		
> 500 บาทขึ้นไป	52	32.50
300 – 500	29	18.20
200 – 300	24	15.10
1 – 50	23	14.50
51 – 100	20	12.60
101 - 200	11	6.90
บุคคลใกล้ชิด		
ทราบ	96	60.80
ไม่ทราบ	61	38.60
ไม่แน่ใจ	1	0.60
การบำบัดรักษา		
ไม่เคย	132	83.00
เคย	27	17.00
ระยะเวลาบำบัด		
1 เดือน	86	56.20
4 เดือน	27	17.60
3 เดือน	21	13.70
2 เดือน	19	12.40
*คดีที่ถูกจับกุม		
ยาบ้า	93	59.60
กัญชา	54	34.60
เฮโรอีน	6	3.80
กระท่อม	1	0.60
ยาไอซ์	12	7.70

\*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 69 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำแนกตามข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุระหว่าง 7-20 ปี อายุเฉลี่ย 19.43 ปี (SD = 6.08) อายุต่ำสุด 10 ปี สาเหตุสำคัญที่ใช้สารเสพติดครั้งแรกส่วนใหญ่อยากลอง ร้อยละ 63.80 เพื่อนชวน ร้อยละ 16.30 สารเสพติดที่ใช้ครั้งแรกคือ ยาบ้า ร้อยละ 49.40 กัญชา ร้อยละ 42.20 เป็นผู้เสพ ร้อยละ 55.00 ลักษณะการใช้สารเสพติดในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เป็นบางครั้งเมื่อมีความต้องการหรือหาซื้อได้ ร้อยละ 50.90 ใช้เป็นประจำเกือบทุกวันหรือทุกวัน ร้อยละ 27.70 โดยวิธีการสูบ ร้อยละ 92.40 สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้สารเสพติดในปัจจุบันเพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 34.40 เพื่อลดความเครียดหรือกังวลใจ ร้อยละ 24.50 แหล่งซื้อสารเสพติดส่วนใหญ่มาจากเพื่อนที่ใช้สารเสพติดด้วยกัน ร้อยละ 79.90 มีผู้มาจำหน่ายให้ถึงที่ ร้อยละ 27.00 ค่าใช้จ่ายในการเสพยาเสพติดเฉลี่ย > 500 บาทขึ้นไป บุคคลใกล้ชิดคิดทราบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้สารเสพติด ร้อยละ 60.80 ส่วนใหญ่ไม่เคยบำบัดรักษา ร้อยละ 83.00 ระยะเวลาขณะที่บำบัดอยู่นานเป็นเวลา 1 เดือน ร้อยละ 56.20 และ 4 เดือน ร้อยละ 17.60 คดีที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นยาบ้า ร้อยละ 59.60 กัญชา ร้อยละ 34.60

ตารางที่ 70 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมและลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว (N =160)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สภาพการครองเรือนของบิดา – มารดา		
อยู่ด้วยกัน	84	52.50
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่	36	22.50
บิดาถึงแก่กรรม	25	15.60
มารดาถึงแก่กรรม	12	7.50
บิดามารดาถึงแก่กรรม	3	1.90
กรณีที่บิดา – มารดาแยกกันอยู่		
บิดามารดามีครอบครัวใหม่	13	30.20
บิดามีภรรยาใหม่	13	30.20
มารดามีสามีใหม่	12	27.90
แยกกันอยู่โดยไม่ได้มีครอบครัวใหม่	5	11.60

## ตารางที่ 70 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ที่พักอาศัยในปัจจุบัน		
พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา	63	39.40
สามี / ภรรยา	37	23.10
มารดา	28	17.50
ญาติ	13	8.10
บิดา	11	6.90
อยู่คนเดียว	10	6.30
อาชีพหลักของบิดา		
รับจ้างทั่วไป	52	35.90
เกษตรกรกรรม	37	25.50
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	31	21.40
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	14	9.70
ว่างงาน	11	7.50
อาชีพหลักของมารดา		
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	49	30.60
รับจ้างทั่วไป	33	22.60
เกษตรกรกรรม	33	22.60
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	12	8.20
ว่างงาน	11	7.50
แม่บ้าน	8	5.50
รายได้ของบิดามารดา (บาท/เดือน)		
ต่ำกว่า 5,000	50	33.80
5,001 – 10,000	43	29.10
มากกว่า 20,000	22	14.90
10,001 – 15,000	20	13.50
15,001 – 20,000	13	8.80

## ตารางที่ 70 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนพี่น้อง ( $\bar{X} = 3.79, SD = 2.25$ )		
คนเดียว	21	13.10
2 คน	34	21.30
3 คน	27	16.90
4 คน	29	18.10
5 คนขึ้นไป	49	30.80
ลำดับพี่น้อง ( $\bar{X} = 2.53, SD = 1.83$ )		
1	63	39.60
2	34	21.40
3	25	15.70
4	15	9.40
5 ขึ้นไป	7	4.40
จำนวนสมาชิกในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.49, SD = 2.05$ )		
1 – 5	117	75.90
6 – 10	36	23.30
11 คนขึ้นไป	1	1.30
สถานภาพในครอบครัว		
สมาชิก	107	66.90
หัวหน้าครอบครัว	30	18.80
ผู้อาศัย	22	13.80
พี่น้อง	1	0.60
บุคคลที่ไว้วางใจ		
มารดา	61	38.40
เพื่อน	38	23.99
ญาติที่เลี้ยงดูหรือให้ที่พักอาศัย	29	18.20
สามี/ภรรยา	19	11.90
พี่น้อง	12	7.50

## ตารางที่ 70 (ต่อ)

ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัว		
รักใคร่กลมเกลียวกันดี	95	60.10
ทะเลาะกันบางครั้ง	54	34.20
ทะเลาะกันเป็นประจำ	5	3.20
ไม่ค่อยได้พบปะกัน	4	2.50
การเลี้ยงดูในครอบครัว		
เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล	113	71.50
เลี้ยงดูอย่างทอดทิ้ง	18	11.40
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน	14	8.90
เลี้ยงดูแบบตามใจ	13	8.20
การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ		
บิดามารดา	49	31.20
มารดา	39	24.80
อื่นๆ	23	14.60
พี่น้อง	22	14.00
สามี/ภรรยา	18	11.50
บิดา	6	3.80

จากตารางที่ 70 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม และลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า สถานภาพการครองเรือนของบิดาและมารดา อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 52.25 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 22.50 ในกรณีที่แยกกันอยู่ บิดามารดามีครอบครัวใหม่ ร้อยละ 30.20 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 39.40 อยู่กับสามีหรือภรรยา ร้อยละ 23.10 อาชีพหลักของบิดา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 35.90 เกษตรกรรม ร้อยละ 25.50 อาชีพหลักมารดา ค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 30.60 รับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ร้อยละ 22.60 รายได้เฉลี่ยของบิดา มารดาต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 30.80 จำนวน 2 คน ร้อยละ 21.30 ลำดับพี่น้องในครอบครัว คนแรก ร้อยละ 39.60 คนที่ 2 ร้อยละ 21.40 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน ร้อยละ 75.90 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมาชิก ร้อยละ 66.90 หัวหน้า

ครอบครัว ร้อยละ 18.80 บุคคลที่ไว้วางใจ มารดา ร้อยละ 38.40 เพื่อน ร้อยละ 23.99 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในครอบครัวส่วนใหญ่รักใคร่กลมเกลียวกันดี ร้อยละ 60.10 การเลี้ยงดูในครอบครัวส่วนใหญ่เลี้ยงดูอย่างใช้เหตุผล ร้อยละ 71.50 การปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบิดามารดา ร้อยละ 31.20

ตารางที่ 71 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติและระดับความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละด้าน

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว	3.70	0.54	มาก
สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน	3.26	0.74	มาก
สภาพแวดล้อม ชุมชน	3.28	0.56	มาก
ด้านความเชื่อ / จิตวิญญาณ	2.44	0.53	ปานกลาง
ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด	3.69	0.50	มาก

จากตารางที่ 71 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ ด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ ( $\bar{X} = 2.44$ ,  $SD = 0.53$ ) และในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ( $\bar{X} = 3.70$ ,  $SD = 0.54$ ) ด้านทัศนคติต่อสารเสพติด ( $\bar{X} = 3.69$ ,  $SD = 0.50$ ) ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชน ( $\bar{X} = 3.28$ ,  $SD = 0.56$ ) สภาพแวดล้อมด้านเพื่อน ( $\bar{X} = 3.26$ ,  $SD = 0.74$ )

ตารางที่ 72 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวจำแนกเป็นรายข้อ (N =160)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย	4.69	.75	มาก
มักมีเหตุการณ์การต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว	4.57	.89	มาก
บุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา	4.31	.99	มาก
ทุกคนในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือดูแลกันดี	4.05	.97	มาก

ตารางที่ 72 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ การปฏิบัติ
ครอบครัวรู้สึกกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย			
เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	3.91	1.10	มาก
บุคคลในครอบครัวให้ความไว้วางใจท่าน	3.61	1.07	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อมีเวลาว่าง	3.54	1.00	มาก
บุคคลในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของท่าน	3.52	1.14	มาก
เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาคณะในครอบครัว	3.49	1.30	มาก
ครอบครัวมีความกังวลหรือกลัวเรื่องสุขภาพของท่าน	3.26	1.28	มาก
บุคคลในครอบครัวมักจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ			
เรื่องภายในครอบครัว	3.00	1.10	มาก
ท่านได้ไปพักผ่อนร่วมกับบุคคลในครอบครัว			
เมื่อมีเวลาว่าง	2.80	1.20	มาก

จากตารางที่ 72 พบว่า ลักษณะสัมพันธภาพของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บุคคลในครอบครัวของท่านเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ( $\bar{X} = 4.69$ ,  $SD = 0.76$ ) รองลงมา คือ มักมีเหตุการณ์ต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายระหว่างท่านกับบุคคลในครอบครัว ( $\bar{X} = 4.57$ ,  $SD = 0.89$ ) และบุคคลในครอบครัวของท่านดื่มสุรา ( $\bar{X} = 4.31$ ,  $SD = 0.99$ )

ตารางที่ 73 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมกับเพื่อน  
จำแนกเป็นรายข้อ (N=160)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับการปฏิบัติ
ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง	3.90	1.02	มาก
เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษา กลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด	3.76	1.13	มาก
เพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพ ยาเสพติดอีก	3.72	1.03	มาก
เพื่อนนำยาเสพติดมาให้ท่านเสพ	3.63	1.21	มาก
ท่านปฏิเสธไม่ได้เมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด	3.56	1.15	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน	3.55	1.06	มาก
ท่านไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ยังเสพยาอยู่	3.48	1.17	มาก
กลุ่มเพื่อนสนิทของท่านส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติด	3.13	1.09	มาก
เพื่อนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้ยังใช้ยาเสพติด	2.99	1.22	มาก
เพื่อนสนิทของท่านใช้สารเสพติด	2.75	1.12	ปานกลาง
เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเสพยาเสพติด	2.61	1.09	ปานกลาง
กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด	2.46	1.13	ปานกลาง

จากตารางที่ 73 พบว่า การปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมด้านเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 2 ข้อ คือ เพื่อนของท่านชักชวนให้ท่านเสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 2.61$ ,  $SD = 1.09$ ) และ กลุ่มเพื่อนที่ท่านคบไม่เสพยาเสพติด ( $\bar{X} = 2.46$ ,  $SD = 1.13$ ) ส่วนข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ท่านทำในสิ่งที่เพื่อนต้องการทุกอย่าง ( $\bar{X} = 3.90$ ,  $SD = 1.02$ ) รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหาคับข้องใจท่านมักไปปรึกษากลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด ( $\bar{X} = 3.76$ ,  $SD = 1.13$ ) และเพื่อนที่เสพยาชักชวนให้ท่านกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( $\bar{X} = 3.72$ ,  $SD = 1.03$ )



ตารางที่ 74 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพแวดล้อมด้านชุมชน (N = 160)

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
สภาพแวดล้อมด้านชุมชน		
ในชุมชนมีโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	74	46.80
ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด	89	56.30
เคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกำหนายยาเสพติด	56	35.70
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่าย / ใช้สารเสพติด	74	46.80

จากตารางที่ 74 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในชุมชนมีโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด ร้อยละ 46.80 ในชุมชนมีแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 56.30 กลุ่มตัวอย่างเคยจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับกำหนายยาเสพติด ร้อยละ 35.70 และสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งที่มีการจำหน่ายหรือใช้สารเสพติด ร้อยละ 46.80

ตารางที่ 75 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมด้านชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ (N = 160)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความเป็นจริง
ท่านปรับตัวเข้ากับคนละแวกบ้านเพื่อนร่วมงาน			
ไม่ได้	3.89	1.22	มาก
ท่านมักไปในสถานที่ที่มั่วสุ่มยาเสพติด	3.52	1.11	มาก
โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง	3.51	1.15	มาก
คนในละแวกบ้าน (เพื่อนร่วมงาน) ไม่ยอมรับท่าน			
เพราะคิดว่าท่านใช้ยาเสพติด	3.43	1.11	มาก
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียน บ้านของท่านมีแหล่งค้ายาเสพติดที่หาซื้อได้ง่าย	3.40	1.16	มาก
ชุมชนของท่านอาศัยอยู่สามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย	3.22	1.20	มาก

ตารางที่ 75 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความเป็นจริง
บริเวณที่ทำงาน โรงเรียนบ้านของท่านมีเพื่อนเสพยาเสพติด	3.16	1.03	มาก
ท่านรู้สึกว่าคุณในชุมชนรังเกียจที่ท่านใช้ยาเสพติด	3.06	1.19	มาก
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	2.99	1.26	มาก
ตั้งแต่ท่านเสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน	2.70	1.59	ปานกลาง

จากตารางที่ 75 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” เพียงข้อเดียวคือ ตั้งแต่เสพยาเสพติดท่านไม่เคยย้ายบ้าน ( $\bar{X} = 2.70$ ,  $SD = 1.59$ ) และ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านปรับตัวเข้ากับคนละแวกบ้านหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ( $\bar{X} = 3.89$ ,  $SD = 1.20$ ) รองลงมา คือ ท่านมักไปในสถานที่มั่วสุมยาเสพติด ( $\bar{X} = 3.52$ ,  $SD = 1.11$ ) และ โรงเรียนหรือชุมชนของท่านมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ( $\bar{X} = 3.51$ ,  $SD = 1.15$ )

ตารางที่ 76 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านความเชื่อ จิตวิญญาณ จำแนกเป็นรายข้อ (N = 160)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
ท่านเชื่อว่าการติดยาเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว	3.06	1.330	มาก
ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป	2.98	1.332	มาก
ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง	2.76	1.26	ปานกลาง
ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ	2.68	1.10	ปานกลาง
ท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้	2.52	1.50	ปานกลาง
ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทำให้เข้มแข็งขึ้น	2.40	1.09	ปานกลาง
การใช้สารเสพติดท่านเชื่อว่าไม่ได้ทำผิดหลักศาสนา	2.28	1.26	ปานกลาง

ตารางที่ 76 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน	2.19	1.07	ปานกลาง
ท่านนึกถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าคนรอบข้าง	2.11	1.08	ปานกลาง
การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสถานบำบัด	1.53	1.27	น้อย

จากตารางที่ 76 พบว่า ความเป็นจริงด้านความเชื่อ/จิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างเลือกระดับ “ตรงกับความเป็นจริงมาก” จำนวน 2 ข้อ คือ ท่านเชื่อว่าการติดยาเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ( $\bar{X} = 3.06$ ,  $SD = 1.33$ ) และ ท่านเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดเราไม่สามารถควบคุมมันได้ต้องอาศัยพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป ( $\bar{X} = 2.98$ ,  $SD = 1.33$ ) “ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง” โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ( $\bar{X} = 2.76$ ,  $SD = 1.26$ ) รองลงมาคือ ท่านมีศาสนาหรือสิ่งที่ตัวเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ( $\bar{X} = 2.68$ ,  $SD = 1.10$ ) และท่านเชื่อว่าท่านไม่มีพลังในการเอาชนะยาเสพติดได้ ( $\bar{X} = 2.52$ ,  $SD = 1.50$ ) และ “ตรงกับความเป็นจริงน้อย” เพียงข้อเดียวคือ การติดยาเสพติดสามารถเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสถานบำบัด ( $\bar{X} = 1.53$ ,  $SD = 1.27$ )

ตารางที่ 77 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อสารเสพติด จำแนกเป็นรายข้อ (N = 160)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรม	4.48	0.65	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ	4.24	0.82	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง			
ครอบครัว สังคม	4.18	0.85	มาก
ข้าพเจ้าไม่ควรเสพยาเสพติด	4.04	1.03	มาก
สังคม ไม่ยอมรับผู้ติดยาเสพติด	4.01	0.94	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นที่โก้ เก้ ท้นสมัย	3.91	0.99	มาก

ตารางที่ 77 (ต่อ)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับความคิดเห็น
การเสพยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	3.77	1.06	มาก
ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวพิษภัยจากการเสพยาเสพติด	3.71	1.20	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์	3.67	1.12	มาก
ยาเสพติดเป็นสิ่งที่มียุทธพลต่อข้าพเจ้า	3.59	1.08	มาก
การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ	3.58	0.99	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น	3.30	1.04	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้มีความกล้าหาญ	3.24	1.16	มาก
การเสพยาเสพติดช่วยแก้แอกการเงินอายุได้	3.12	1.09	มาก
การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้	2.71	1.04	ปานกลาง

จากตารางที่ 77 พบว่า ด้านทัศนคติต่อสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว คือ การเสพยาเสพติดทำให้คลายเครียดได้ ( $\bar{X} = 2.71$ ,  $SD = 1.04$ ) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การเสพยาเสพติดทำให้อารมณ์ดี (  $\bar{X} = 4.48$ ,  $SD = 0.65$ ) การเสพยาเสพติดทำให้เสียบุคลิกภาพ ( $\bar{X} = 4.24$ ,  $SD = 0.82$ ) และการเสพยาเสพติดทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ( $\bar{X} = 4.18$ ,  $SD = 0.85$ )